



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

58225s

3 2044 106 413 123

Harvard University



FARLOW  
REFERENCE LIBRARY  
OF  
CRYPTOGAMIC BOTANY

Pressboard  
Pamphlet  
Binder  
Gaylord Bros.  
Makers  
Syracuse, N. Y.  
JAN 21 1908

*Herrn Professor W. G. Farlow  
Anschickungswald überreicht  
A. Steiner.*

**DIE SPEZIALISATION  
DER ALCHIMILLEN-BEWOHNENDEN  
SPHAEROTHECA HUMULI (DC) BURR.**

---

**INAUGURAL-DISSERTATION**

**DER**

**HO**

**TÄT**

**W. G. FARLOW**

**ERI**

**RDE**

**JOHANN ALFRED STEINER**  
**VON TRACHSELWALD (KT. BERN).**

---

**MIT 1 TAFEL UND 3 FIGUREN IM TEXT.**

---

Von der philosophischen Fakultät auf Antrag von Herrn Prof. Dr. Ed. Fischer  
angenommen.

Bern, den 16. Mai 1908.

Der Dekan: Prof. Dr. Studer.

—\*—

**JENA**  
**GUSTAV FISCHER**  
1908.

S8225s

---

Separatabdruck aus dem  
Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektions-  
krankheiten. II. Abt. XXI. Band. 1908.

---

## A. Einleitung.

Im Jahre 1900 erschien die erste umfassende Monographie der Erysiphaceen von Ernest S. Salmon (4). Dieselbe behandelt in einläßlicher und klarer Weise die morphologischen Verhältnisse der Erysiphaceen und stellt im ganzen 49 Species und 11 Varietäten auf, was eine bedeutende Reduktion der Artenzahl gegenüber früheren Bearbeitungen darstellt; so sind z. B. in Saccardos „Sylloge Fungorum“ 111 Species und 1 Varietät verzeichnet. Ueber das biologische Verhalten der einzelnen Species war zur Zeit der Herausgabe der Salmon'schen Monographie noch nichts bekannt. Das Verdienst, die Frage der Spezialisierung der Erysiphaceen zuerst experimentell geprüft zu haben, kommt Neger zu, der 1902 eine Arbeit veröffentlichte (1), die den Zweck hatte, „über das Wesen des Parasitismus der Erysiphaceen Klarheit zu verschaffen“. In dieser Arbeit wird gezeigt, daß die Erysiphaceen-species: *Erysiphe Cichoracearum* DC., *Erysiphe Polygoni* DC., *Erysiphe Galeopsidis* DC., *Microsphaera Astragali* (DC.) Trev. in mehrere biologische Arten zerfallen, und daß im allgemeinen das Infektionsvermögen einer biologischen Art nicht über eine Wirtsgattung hinausgeht; in einem Falle (*Erysiphe Polygoni* auf *Trifolium incarnatum*) war dasselbe augenscheinlich auf eine einzige Species beschränkt. Diese ausgesprochene Spezialisierung regt Neger im weiteren zu der Frage an, wie der Mehltau auf gewissen einjährigen Pflanzen, auf die der Pilz spezialisiert ist und auf denen nie Peritheecien beobachtet werden, überwintert. Er glaubt die Lösung darin zu finden, daß er ein erweitertes Infektionsvermögen der Peritheecien gegenüber der Infektionskraft der Konidien annimmt, so daß die erwähnten einjährigen Pflanzen von anderen Wirtsgattungen aus jedes Jahr neu infiziert würden. Auf diesen Punkt werde ich noch zurückkommen.

Marchal (2) zerlegte im Jahre 1902 *Erysiphe graminis* DC. in 7 verschiedene biologische Arten, nämlich in die Formae speciales: *E. gram. f. sp. Hordei*; *E. gram. f. sp. Tritici*; *E. gram. f. sp. Secalis*; *E. gram. f. sp. Avenae*; *E. gram. f. sp. Poae*; *E. gram. f. sp. Agropyri*; *E. gram. f. sp. Bromi*. Auch bei diesen biologischen Species geht die Infektionskraft im allgemeinen nicht über die Gattung der Wirte hinaus; die einzige Ausnahme macht *Erysiphe gram. f. sp. Avenae*, die auch *Arrhenatherum elatius* infizieren soll. Diese letztere Infektion wurde später von Salmon nachgeprüft und von ihm nicht bestätigt.

Sehr ausführlich hat Salmon die Spezialisierung der *Erysiphe graminis* DC. im Genus *Bromus* festgestellt. Es geschah dies in zwei Veröffentlichungen: „On specialisation of parasitism in the Erysiphaceae“ (5) und „On *Erysiphe graminis* DC.“ (6). In der ersten

Publikation kommt Salmon zu folgendem Schlusse: „Referring now to the main series of experiments . . . . , we find that four, if not five, of the *Oidia* used are „biologic forms“, each with different physiological characteristics as shown by their distinctive powers of infection“, und weiter: „There is every reason to believe that there exists within the genus *Bromus* — in addition to the four or more probably five, *Oidia* . . . . a considerable number of biologic forms.“ Die zweite angeführte Publikation verfolgt die Spezialisierung weiter und dehnt die Untersuchung auf eine große Zahl von *Bromus*-Arten aus. Hauptsächlich werden hier aber Fragen behandelt, die von mir später in Betracht gezogen werden sollen: die spezifische Empfänglichkeit oder Nichtempfänglichkeit einer Art und die sogenannten „bridging species“. Eine spätere Untersuchung Salmons (7) beschäftigte sich mit sehr verschiedenen Mehltauespezies: *E. graminis* DC.; *Sphaerotheca Humuli* DC.; *Sphaerotheca Humuli* DC. var. *fuliginea*, *Erysiphe Cichoracearum* DC. und *Erysiphe Galeopsidis* DC. Auch hier ergab sich das von vornherein wahrscheinliche Resultat, daß der Parasit nicht von einer Wirtsgattung auf eine andere übergehen konnte; so war es z. B. *Sphaerotheca Humuli* unmöglich, von *Potentilla reptans* auf *Alchim. vulgaris* und *arvensis*, *Fragaria* sp., *Spiraea Ulmaria*, *Agrimonia Eupatoria* und *Poterium officinale* überzugehen.

Um die Versuche von Marchal nachzuprüfen, unternahm Reed 1903 Versuche mit den Oidien auf *Secale cereale* und *Poa pratensis* (12). Die spezialisierten Formen Marchals bestätigten sich; jede Wirtsgattung beherbergt ihre eigene biologische Parasitenart; im weiteren ist Reed aber geneigt, den Parasiten auf *Poa*-Species noch in weitere 3 biologische Arten zu zerlegen, da sich *Poa nemoralis*, *Poa trivialis* und *Poa compressa* in ihrer Empfänglichkeit voneinander unterscheiden.

Einen eigentümlichen Gegensatz zu dieser strengen Spezialisierung der verschiedenen Erysiphaceen-Species bilden zwei Untersuchungen. Die erste wurde von Magnus 1898 (14) ausgeführt und ergab, daß *Sphaerotheca Humuli* von *Humulus lupulus* auf *Taraxacum officinale* übergang. Neger (1) macht aber hierbei darauf aufmerksam, daß sich die Inkubationszeit des Pilzes in diesem Falle auf nahezu 3 Wochen belief, was den Erfahrungen, die von allen anderen Untersuchern gemacht wurden, widerspricht: nach 4—7 Tagen hat sich die Infektion in den meisten Fällen vollzogen, über 10 Tage hinaus dauert die Inkubationszeit wohl nie. So sind einige Zweifel in bezug auf die Reinheit dieses Magnuschen Versuches nicht zu unterdrücken. Die zweite Untersuchung, die eine strenge Spezialisierung aller Erysiphaceen-species verneint, wurde von Reed (13) vollzogen und wies nach, daß die Familie der Cucurbitaceen mit den Genera *Cucurbita*, *Cucumis*, *Lagenaria*, trotz einer sehr großen Zahl von Varietäten, von ein und derselben biologischen Art der *Erysiphe Cichoracearum* DC. bewohnt wird. Dagegen zeigten einige Experimente an, daß das Infektionsvermögen dieser biologischen Art nicht über die Familie der Cucurbitaceen hinausgeht.

Die Frage, wie sich die Infektionskraft der Ascosporen verhalte, ob die Anschauung Negers (1), daß ihnen ein größerer Infektionskreis zukomme als den Konidien, gerechtfertigt sei, wurde von Salmon und Marchal untersucht, so daß wir nun mit gutem Rechte behaupten



können, daß sich Ascosporen und Konidien in der Infektionskraft gleich verhalten. Zunächst wies Salmon nach (5), daß Negers Beobachtungen bezüglich des Nichtvorkommens von Perithezien auf gewissen einjährigen Pflanzen unvollkommene seien, indem auf den betreffenden Arten Perithezien von verschiedenen Forschern gefunden wurden. Seine Experimente (8) zeigten ferner, daß die Ascosporen von *Erysiphe graminis* DC. auf *Hordeum vulgare* die gleichen Wirte infizierten wie die Konidien; ebenso stimmte die Infektionskraft der Ascosporen von *Erys. graminis* DC. auf *Bromus commutatus* genau mit der der Konidien überein (11). Marchal (3) hatte gleichzeitig mit Salmon in Experimenten mit Ascosporen der *Erys. graminis* DC. auf Weizen, Roggen und Gerste die Identität des parasitären Charakters der Ascosporen und Konidien gefunden.

Es erübrigt zum Schlusse dieser geschichtlichen Uebersicht noch, auf einige Studien Salmons hinzuweisen, die sich mit besonderen Modifikationen in der Empfänglichkeit einer Wirtsspecies unter gewissen Verhältnissen befassen. Es wird durch diese Studien der Nachweis geleistet (9, 10), daß mechanische Verletzungen der Epidermis der Infektionspflanzen, ferner Einwirkungen von Narkotika (Aether, Chloroform, Alkohol) und von höherer Temperatur (50° C) die Empfänglichkeit der betreffenden Pflanzen erhöhen, so daß dieselben durch eine biologische Parasitenspecies infiziert werden können, gegen die sie sich unter normalen Verhältnissen immun verhalten.

---

Die vorliegende Arbeit wurde im Botanischen Institute der Universität Bern auf Veranlassung von Herrn Prof. Ed. Fischer ausgeführt. Es sei mir gestattet, meinem hochverehrten Lehrer sowohl für die Leitung meiner Arbeit, als auch für die vielen Anregungen meinen herzlichsten Dank auszusprechen; ebenso bin ich Herrn Obergärtner Schenk und seinen Gehilfen für die Pflege der Versuchspflanzen dankbar. Im Sommer 1906 wurde eine Anzahl von Voruntersuchungen unternommen, die vor allem den Zweck hatten, ein geeignetes Infektionsverfahren ausfindig zu machen. Die Experimente wurden im Sommer 1907 fortgesetzt und im Herbst 1907 zum Abschlusse gebracht. Es wurde mir die Aufgabe gestellt, die Spezialisierung der *Sphaerotheca Humuli* (DC.) Burr. im Genus *Alchimilla* zu verfolgen. Wie aus dem vorangehenden geschichtlichen Abschnitte hervorgeht, trägt im allgemeinen jedes Genus der von Mehltau befallenen Pflanzen eine besondere biologische Parasitenspecies; es war deshalb von vornherein wahrscheinlich und zum Teil auch durch die Versuche von Salmon (7) bewiesen, daß bei einem größer gewählten Infektionskreise (mehrere Pflanzenfamilien) der *Sphaerotheca Humuli* sich vor allem eine solche Spezialisierung auf einzelne Genera ergeben hätte. Infolgedessen verzichtete ich darauf, dieses wahrscheinliche Resultat weiter als durch einige kleinere Proben zu beweisen und beschränkte mich darauf, das Verhalten der *Sphaerotheca Humuli* auf *Alchimilla*-Arten zu prüfen. Das Genus *Alchimilla* bietet den Vorteil einer ganz vorzüglichen systematischen Durcharbeitung durch R. Buser. Durch seine genauen Untersuchungen ist das Genus bis in die kleinsten Einzelheiten aufs vortrefflichste durchgearbeitet. Ich bin Herrn R. Buser für seine bereitwillige Mithilfe, die zu verschiedenen Malen in der Sendung einer großen Zahl von Versuchspflanzen und in vielen Bestimmungen bestand, zu höchstem Danke ver-

pflichtet. Ohne seine Mithilfe wäre es mir unmöglich gewesen, meine Aufgabe mit Erfolg durchzuführen. Das Genus *Alchimilla* wird von R. Buser in einer seiner letzten Publikationen (15) folgendermaßen eingeteilt: Subgenus I: *Aphanes*; dieses besteht nur aus der *Alch. arvensis* L.; Subgenus II: *Eu-Alchimilla*; dieses Subgenus umfaßt alle übrigen Alchimillen, die Buser in 6 Gruppen auseinanderhält: I. *Pentaphyllae*, II. *Alpinae*, III. *Pubescentes*, IV. *Splendentes*, V. *Calicinae*, VI. *Vulgares*. Jede dieser Gruppen zerfällt zunächst in eine Anzahl von Arten, die systematisch noch leicht auseinanderzuhalten sind, sich also durch ziemlich scharfe, morphologische Eigentümlichkeiten auszeichnen und deshalb als „große Arten“ zu bezeichnen wären. Um eine jede dieser „großen Arten“ gruppieren sich nun verschiedene „kleine Arten“, die erst durch die äußerst exakten Buserschen Untersuchungen in ihren Merkmalen erfaßt und charakterisiert wurden. Wir haben also im Genus *Alchimilla* eine klare Abstufung der morphologischen Unterschiede, eine Stufenfolge von den Subgenera bis zu den kleinen Arten. Es waren hauptsächlich diese sofort in die Augen fallenden Vorteile, die die Wahl auf das Genus *Alchimilla* als Infektionskreis der *Sphaerotheca Humuli* fallen ließen. Es war dabei die Möglichkeit vorhanden, die Spezialisierung des Pilzes auf den verschiedenen Stufen der systematischen Gruppen zu verfolgen, und gerade weil das Genus *Alchimilla* eine Anzahl „kleiner Arten“ enthält, konnte man hoffen, die Spezialisierung in ihren Anfängen zu beobachten.

## B. Eigene Infektionsversuche.

### a) Allgemeines.

1) Die Infektionsmethode: In den Versuchen mit Ascosporen wurden die mit Perithezien dichtbesetzten Blätter des Infektionsmaterials in kleine Stücke zerschnitten, und diese Stücke wurden auf die leicht befeuchteten Blätter der Infektionspflanze aufgelegt. Wurde eine Topfpflanze als Infektionsobjekt verwendet, so wurde ein innen mit feuchtem Filtrierpapier bekleideter Glasbecher für 2—3 Tage über die Pflanze gestülpt. Die Infektion war gewöhnlich nach 3—4 Tagen zu konstatieren. In anderen Fällen wurden abgeschnittene Blätter als Infektionsobjekt verwendet; auch in diesem Falle geschah die Infektion vermittelt Auflegen der mit Perithezien besetzten Blattstücke. Ueber die Einzelheiten dieses Verfahrens mit abgeschnittenen Blättern ist weiter unten ausführlich berichtet. Um eine Kontrolle bezüglich Fremdfektionen zu besitzen, wurden in diesen Experimenten mit Perithezien stets einige Blätter vollständig frei gelassen. Die Infektionsexperimente mit Ascosporen blieben stets rein, so daß bei der Beschreibung der einzelnen Infektionsreihen gewöhnlich die Angabe über das Verhalten der Kontrollblätter unterblieben ist.

Die Infektion mit Konidien. In seiner Arbeit über die Versuche mit Ascosporen der *Erysiphe graminis* (8) beschrieb Salmon ein sehr bequemes Infektionsverfahren: Blätter der Infektionspflanze werden abgeschnitten und auf feuchtes Filtrierpapier in einer Petri-Schale ausgebreitet. Die Blätter behalten ihre Vitalität, je nach der Species, 10—20 Tage, so daß, da die Inkubation des Pilzes nur 4—7 Tage beträgt, die Infektionskraft desselben genügend kennen ge-

lernt werden kann. Dieses Verfahren wurde in den nachstehenden Experimenten fast ausschließlich angewendet; um ein Austrocknen der oft nicht ganz dicht schließenden Petri-Schalen zu vermeiden, wurden diese noch in eine feuchte Kammer gestellt. Die Petri-Schalen wurden nach beendigtem Experimente durch eine Temperatur von 120 ° C sterilisiert und selbstverständlich mit neuem Filtrierpapier versehen. Es waren hauptsächlich zwei Gründe, die mich diese Methode so ausgiebig anwenden ließen: Bei den kleinen Artunterschieden der Alchimillen wäre es eine Unmöglichkeit gewesen, junge Pflanzen, die besonders zur Verwendung kommen müssen, so zu bestimmen und auseinanderzuhalten, wie es für die Reinheit eines Experimentes notwendig ist. Ferner sind gewisse Species der Alchimillen besonders leicht für Mehltauinfektionen empfänglich. Es war deshalb notwendig, die jeweilige Infektionsstelle ganz genau umschreiben und bezeichnen zu können, um nicht gewollte Infektionen, die in dieser Arbeit mit den Fremdinfectionen im engeren Sinne allgemein als „Fremdinfectionen“ zusammengefaßt werden, als solche sofort zu qualifizieren. Ein Topf mit einer Anzahl von jungen Setzlingen hätte in dieser Hinsicht unüberwindliche Schwierigkeiten dargestellt. So wurde denn jede der verwendeten Alchimillenarten in einem Topfe oder in mehreren Töpfen herangezogen und jeweilen die geeigneten Blätter zu Infektionszwecken abgetrennt. Im einzelnen wurde dann folgendermaßen infiziert: Die Blätter, welche die zu verwendende Parasitenspecies trugen, wurden in Stücke zerschnitten und diese in einem Fläschchen tüchtig mit Wasser geschüttelt. Das Wasser mit den suspendierten Sporen wurde in ein Spitzglas abgegossen und mit einem kleinen Pinsel auf die Infektionsfläche der in einer Petri-Schale liegenden Blätter aufgetragen. Es konnte so eine ganz scharf begrenzte Fläche infiziert werden und es war möglich, die Begrenzung der Infektionsfläche durch Nachzeichnen auf dem unter den Blättern sich befindlichen Filtrierpapier für die Dauer des Experimentes festzuhalten. Bei der nachfolgenden Entwicklung des Pilzes durfte natürlich nur die Infektionsfläche eine Infektion beherbergen, und es wurde von mir stets besonderes Gewicht darauf gelegt, die Sicherheit einer Infektion von der Schärfe der Infektionsgrenzen abhängig zu machen. Bei reichlicher Entwicklung des Mehltaus zeigte dann die ganze Infektionsfläche Mycel und Konidien und zeichnete sich auch makroskopisch sehr scharf von den umgebenden, nicht infizierten (Kontroll-) Stellen ab. In diesem Falle bezeichnete ich die Infektionsfläche als mit „allgemeinem“ oder „gleichmäßigem“ Mycel versehen. Entwickelte sich der Pilz weniger stark, d. h. keimten nur besonders kräftige Sporen, oder waren bestimmte Zellenkomplexe der Infektionsfläche zur Infektion besser disponiert als andere, so entstand eine weniger gleichmäßig gezeichnete Infektionsfläche. Die Infektion bestand dann in einigen mehr oder weniger zusammenhängenden Mycelflecken und die Infektionsfläche wurde dann von mir als mit „stellenweisem“ Mycel versehen bezeichnet. Auch in diesem Falle konnte die Infektion von allfälligen, in der Umgebung der Infektionsfläche vorkommenden Fremdinfectionen unterschieden werden, indem auch hier das Mycel nie über die Infektionsgrenzen hinausgehen durfte. Es wäre nun trotz dieser Maßregeln möglich gewesen, daß Fremdinfectionen und gewollte Infektion nicht hätten unterschieden werden können: wenn die Fremdinfection in der Infektionsfläche selber aufgetreten und so klein gewesen wäre, daß sie nicht über die Infektionsgrenzen hinausgegriffen hätte. Um diesem außergewöhnlichen Falle vor-

zubeugen, wurden im allgemeinen nur kleinere Flächen (von 1—2 qcm) infiziert und in Fällen, wo stets Fremdinfektionen auftraten, eine besondere charakteristische Gestalt der Infektionsfläche gewählt. Im weiteren waren Fremdinfektionen und gewollte Infektionen durch den verschiedenen Entwicklungsgrad ziemlich leicht auseinanderzuhalten. Denn die Infektion durch fremdes Sporenmaterial geschah kürzere oder längere Zeit vor der Infektion im Experimente und wurde dann durch die günstigen Umstände, in die der Pilz versetzt wurde, ausgelöst. So zeigten diese Fremdinfektionen einen viel fortgeschrittenen Entwicklungsgrad als die gewollte Infektion, d. h. nach 4—5 Tagen war bei ihnen schon reichliche Konidienbildung zu sehen, während die im Experiment infizierte Fläche nur Mycel oder nur ganz spärliche Konidienbildung aufwies.

2) Allgemeine Fehlerquellen. Als erste allgemeine Fehlerquelle sind die „zweifelhaften“ Infektionsresultate anzusehen. Diese Resultate kehren ziemlich oft wieder, und namentlich sind es die *Alpinae*, welche davon betroffen waren. Unter „zweifelhaften Infektionen“ sind zwei verschiedene Fälle zusammengefaßt. Es kam in meinen Versuchen oft vor, daß eine Infektion mit großer Wahrscheinlichkeit als positive bezeichnet werden konnte, daß aber ihre Stärke so gering war, daß von einem Nachzeichnen der Infektionsgrenzen durch die Infektion keine Rede war. Infolgedessen fehlte ein äußerst wichtiger Anhaltspunkt zur Identifizierung der Infektion, und trotzdem in solchen Fällen die Kontrollstellen absolut frei blieben, mußte die Infektion als „zweifelhaft“ bezeichnet werden. In diesem Falle würde also die zweifelhafte Infektion eine äußerst schwache positive Infektion bedeuten. Die kleinere Zahl von „zweifelhaften Infektionen“ wurde geliefert durch solche Versuche, in denen die Infektion der Infektionsfläche eine nicht sehr starke und infolgedessen unscharf begrenzte war, und in denen außerdem noch kleinere Fremdinfektionen auf den Kontrollstellen auftraten. Allein auch in diesem Falle ist das zweifelhafte Resultat eigentlich auf die Schwäche der Infektion zurückzuführen; denn durch die Kraftlosigkeit der Infektion wurde die Unschärfe der Infektionsgrenzen bedingt. Waren die Fremdinfektionen auf den Kontrollstellen so stark, daß ihre Ausdehnung der Infektion in den Infektionsflächen fast gleich war, so wurden diese Infektionen abgebrochen und als typische „Fremdinfektionen“ bezeichnet.

Die zweite Fehlerquelle liegt in der verschiedenen Empfänglichkeit der Blätter bei verschiedenem Alter. Salmon (11) zeigte, daß junge *Hordeum*-Blätter sich mit dem *Oidium* auf *Triticum* infizieren, während ältere Blätter für dieses *Oidium* absolut immun sind. Es wurden deshalb für die Infektionsversuche, wenn immer möglich, junge und vollständig gesunde Blätter genommen. Allein hier und da vermochten die Topfpflanzen den an sie gestellten Anforderungen bezüglich Blattproduktion nicht nachzukommen, und in solchen Fällen mußte ich mich oft mit älteren und weniger lebenskräftigen Blättern begnügen. Ähnlicher Natur ist die dritte Fehlerquelle. Sie bestand darin, daß für einzelne Resultate nicht die genügende Zahl von Experimenten ausgeführt werden konnte, oder daß in den einzelnen Experimenten nicht genug Blätter zur Verfügung standen. Im allgemeinen wurden für jeden Versuch 2 bis 5 Blätter (je nach deren Größe) einer Pflanzenspecies als genügend erachtet. Davon wurden entweder alle teilweise infiziert und so die nicht infizierten Stellen als „Kontrollstellen“ benutzt, oder es wurden 1 bis

2 Blätter vollständig freigelassen und dienten neben den erwähnten Kontrollstellen als weiterer Maßstab für den Grad der Reinheit eines Experimentes.

Meine Ausführungen über die allgemeinen Fehlerquellen zusammenfassend, wäre also folgendes festzustellen: 1) Die positiven Infektionsergebnisse, namentlich der *Alpinae*, mußten infolge der Kleinheit und Schwäche einzelner Infektionen in vielen Fällen als „zweifelhaft“ hingestellt werden. 2) Die negativen Resultate sind als solche nie vollständig sichere Beweise für die Immunität einer Wirtsspecies. [Fehlerquelle 2 und 3; vergleiche auch die Ausführungen von Ed. Fischer (16)].

#### b) Beschreibung der einzelnen Experimente.

Den Ausgangspunkt zu den Experimenten bildete Peritheciennaterial, das im Herbst 1906 in Davos-Schatzalp, ca. 1900 m ü. M., auf *Alch. connivens* Bus. gesammelt wurde. Die Blätter wurden in einem dünnmaschigen Säckchen in Davos im Freien überwintert. Das Peritheciennaterial zeigte sich durchaus infektionstüchtig. Mit diesen Peritheciennaterial wurde Ende April 1907 eine kleine Zahl von Versuchen zur Ausführung gebracht. Das *Oidium* auf *Alchim. connivens* Bus., das in verschiedenen Experimenten verwendet wurde, stammt von diesem Peritheciennaterial her. Die Herkunft der anderen verwendeten Oidien ist unsicher, d. h. es konnte nicht festgestellt werden, ob sich die Pflanzen, deren infizierte Blätter verwendet wurden, durch ein *Oidium*, das auf einer anderen Species wuchs, spontan infizierten oder ob ihre Infektion von Peritheciennaterial herrührte, die auf dieser Pflanze überwintert hatten.

Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß sämtliche auf Alchimillen vorkommende Oidien zu der morphologischen Species *Sphaerotheca Humuli* (DC.) Burr. gehören. Salmon (4) verzeichnet diese Parasiten-species bloß für *Alchim. arvensis* und *vulgaris*; andere Alchimillenarten gibt er nicht an; ich konnte durch Peritheciennaterialuntersuchung feststellen, daß die Oidien auf *Alchim. connivens* Bus., *pastoralis* Bus., *reniformis* Bus., *impexa* Bus. und *flexicaulis* Bus. zu *Sphaerotheca Humuli* (DC.) Burr. gehören.

#### I. Peritheciennaterial von *Alchimilla connivens* Bus. stammend.

(Das Material wurde in Davos-Schatzalp im Freien gesammelt.)

Reihe 1: Eingeleitet am 27. ~~März~~<sup>IV</sup> 1907.

Infektionspflanze: *Alchimilla connivens* Bus. (abgeschnittene Blätter und 1 Topfpflanze).

Beobachtungen:

1. Mai. Zwei der abgeschnittenen Blätter tragen in der Nähe der Blattbasis kleine Mycelflecken. Topfpflanze infektionsfrei.

2. Mai. Die zwei abgetrennten, infizierten Blätter zeigen fortschreitende Entwicklung des Pilzes: ausbreitendes Mycel und schwache Konidienbildung. Die Topfpflanze weist an den mit Peritheciennaterialstücken belegten Blättern vereinzelte Mycelflecken auf. Schwache Konidienbildung. Die nichtinfizierten Blätter sind frei.

6. Mai. Die abgetrennten Blätter zeigen an allen Infektionsstellen dichtes Mycel, das auch auf die nichtinfizierten Stellen übergreift. Starke Konidienbildung. Die Topfpflanze ist ebenfalls sehr stark infiziert, fast alle Blätter zeigen Mycel mit pulverigen Sporenmassen.

Reihe 2: Eingeleitet am 2. Mai 1907.

Infektionspflanze: *Alchimilla impexa* Bus. (abgetrennte Blätter und 1 Topfpflanze).

Beobachtungen:

6. Mai. Abgetrennte Blätter und Topfpflanze zeigen keine Infektion.  
 7. Mai. Abgetrennte Blätter und Topfpflanze zeigen keine Infektion.  
 10. Mai. Die abgetrennten Blätter zeigen an 6 Stellen, die mit Perithezien belegt wurden, leichtes Mycel. Die Topfpflanze ist an drei infizierten Blättern leicht infiziert.  
 13. Mai. Blätter und Topfpflanze zeigen an infizierten und nicht-infizierten Stellen starke Mycelbildung mit pulverigen Sporenmassen.

Reihe 3: Eingeleitet am 4. Mai 1907.

Infektionspflanzen:

- |  |   |
|--|---|
| <p>Vulgares:<br/>         1. <i>Alch. connivens</i> Bus.<br/>         Pubescentes:<br/>         2. <i>Alch. sericata</i> Rehb.<br/>         Alpinae:<br/>         3. <i>Alch. conjuncta</i> Bab.<br/>         4. „ <i>pallens</i> Bus.</p> | <p>Alpinae:<br/>         5. <i>Alch. chirophylla</i> Bus.<br/>         6. <i>Sanguisorba officinalis</i> L.<br/>         7. <i>Potentilla heptaphylla</i><br/>         8. <i>Spiraea Filipendula</i> L.<br/>         9. „ <i>Ulmaria</i> L.</p> |
|--|---|

Beobachtungen:

- 1) *Alchim. connivens* Bus.: 7. Mai. 2 Blätter zeigen an infizierten Stellen leichtes Mycel.  
 8. Mai. 6 infizierte Stellen weisen leichtes Mycel auf.  
 10. Mai. 12 Stellen an 7 Blättern sind mit dichtem Mycel versehen, starke Konidienbildung.  
 13. Mai. Blätter sind überall infiziert; pulverige Sporenmassen. Die übrigen Infektionspflanzen (2—9) bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes vollständig frei.

Reihe 4: Eingeleitet am 11. Mai 1907.

Infektionspflanzen:

- |  |  |
|--|--|
| <p>Vulgares:<br/>         1. <i>Alch. connivens</i> Bus.<br/>         2. „ <i>impexa</i> Bus.<br/>         Pubescentes:<br/>         3. <i>Alch. sericata</i> Rehb.<br/>         Splendentes:<br/>         4. <i>Alch. splendens</i> Christ.</p> | <p>Alpinae:<br/>         5. <i>Alch. conjuncta</i> Bab.<br/>         6. „ <i>pallens</i> Bus.<br/>         7. „ <i>chirophylla</i> Bus.<br/>         8. <i>Spiraea Ulmaria</i> L.<br/>         9. <i>Potentilla heptaphylla</i>.</p> |
|--|--|

Beobachtungen:

- 1) *Alchimilla connivens* Bus.: 13. Mai. 3 verschiedene Stellen, unmittelbar am Rande der aufgelegten Perithezienblattstücke, zeigen ganz schwaches Mycel.  
 14. Mai. 5 Stellen zeigen ziemlich dichtes Mycel, schwache Konidienbildung.  
 15. Mai. Sämtliche 3 infizierten Blätter zeigen auf ganzer Fläche Mycel, schwache Konidienbildung.  
 16. Mai. Beobachtung gleich wie am 15. Mai.  
 17. Mai. Starke Konidienbildung auf allen 3 infizierten Blättern.  
 2) *Alchimilla impexa* Bus.: 13. Mai. Vollständig infektionsfrei.  
 14. Mai. 5 infizierte Stellen zeigen ganz schwaches Mycel.  
 15. Mai. 2 Infektionsblätter (von 3) weisen dichtes Mycel mit schwacher Konidienbildung auf.

16. Mai. Alle 3 Infektionsblätter zeigen dichtes Mycel, Konidienbildung schwach.

17. Mai. Dichtes Mycel und starke Konidienbildung auf allen infizierten Blättern.

Die übrigen Infektionspflanzen (3—9) bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes vollständig frei.

Reihe 5: Eingeleitet am 28. Mai 1907.

Infektionspflanzen:

| Vulgares:                       | Splendentes:                   |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Alch. <i>pastoralis</i> Bus. | 7. Alch. <i>Paicheana</i> Bus. |
| 2. „ <i>demissa</i> Bus.        | Alpinae:                       |
| Calicinae.                      | 8. Alch. <i>obovalis</i> Bus.  |
| 3. Alch. <i>acutiloba</i> Stev. | 9. „ <i>grossidens</i> Bus.    |
| Pubescentes:                    | 10. „ <i>glacialis</i> Bus.    |
| 4. Alch. <i>pubescens</i> Lam.  | 11. „ <i>nitida</i> Bus.       |
| 5. „ <i>flabellata</i> Bus.     |                                |
| 6. „ <i>intermedia</i> Clairv.  |                                |

Beobachtungen:

1) *Alchimilla pastoralis* Bus.: 2. Juni. Vollständig infektionsfrei.

3. Juni. Eine infizierte Stelle zeigt ca. 10 Konidienträger, Mycel ist keines zu sehen.

4. Juni. 3 infizierte Blätter tragen schwaches Mycel, Konidienbildung sehr schwach.

11) *Alchimilla nitida* Bus.: 1. Juni. Infektionsfrei.

2. Juni. Eine Kontrollstelle weist einige Konidienträger auf; Fremdinfection.

4. Juni. Beobachtung gleich wie am 2. Juni.

7) *Alchimilla Paicheana* Bus.: 1. Juni. An nicht infizierter Stelle tritt Infektion auf: Fremdinfection.

4. Juni. Starke Fremdinfection.

Die übrigen Versuchspflanzen bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes vollständig infektionsfrei.

Reihe 6: Eingeleitet am 17. Mai 1907.

Infektionspflanzen:

| Vulgares:                       | Alpinae:                         |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Alch. <i>pastoralis</i> Bus. | 4. Alch. <i>chirophylla</i> Bus. |
| 2. „ <i>impexa</i> Bus.         | 5. „ <i>conjuncta</i> Bab.       |
| Pubescentes:                    | 6. „ <i>pallens</i> Bus.         |
| 3. Alch. <i>sericata</i> Echbg. |                                  |

Beobachtungen:

1) *Alchimilla pastoralis* Bus.: 24. Mai. Eine Stelle zeigt schwache Infektion, bestehend in leichtem Mycel.

25. Mai. 2 infizierte Stellen zeigen schwaches Mycel.

27. Mai. Auf 7 von 8 infizierten Blättern ist gut entwickeltes Mycel zu sehen. Schwache Konidienbildung.

29. Mai. Alle 8 infizierten Blätter zeigen dichtes Mycel mit starker Konidienbildung.

2) *Alchimilla impexa* Bus.: 24. Mai. Vollständig infektionsfrei.

27. Mai. Von 4 infizierten Blättern zeigen 2 schwaches Mycel.

29. Mai. Von 4 infizierten Blättern zeigen 3 dichtes Mycel mit guter Konidienbildung.

Die übrigen Versuchspflanzen bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes infektionsfrei.

Tabelle zu den Infektionsversuchen 1—6,  
ausgeführt mit Ascosporenmaterial von *A. connivens* stammend.

| Infektionspflanzen                            | Reihe<br>1 | Reihe<br>2 | Reihe<br>3 | Reihe<br>4 | Reihe<br>5 | Reihe<br>6 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vulgares: <i>Alch. connivens</i> Bus.         | +          |            | +          | +          |            |            |
| " <i>impexa</i> Bus.                          |            | +          |            | +          |            | +          |
| " <i>pastoralis</i> Bus.                      |            |            |            |            | +          | +          |
| " <i>demissa</i> Bus.                         |            |            |            |            | —          |            |
| Pubescentes: <i>Alch. pubescens</i> Lam.      |            |            |            |            | —          |            |
| " <i>flabellata</i> Bus.                      |            |            |            |            | —          |            |
| " <i>intermedia</i> Clairv.                   |            |            |            |            | —          |            |
| " <i>sericata</i> Rehb.                       |            |            | —          | —          |            | —          |
| Splendentes: <i>Alch. splendens</i> Christ    |            |            |            | —          |            |            |
| " <i>Paicheana</i> Bus.                       |            |            |            |            | o          |            |
| Calicinae: <i>Alch. acutiloba</i> Stev.       |            |            |            |            | —          |            |
| Alpinae: <i>Alch. conjuncta</i> Bab.          |            |            | —          | —          |            | —          |
| " <i>grossidens</i> Bus.                      |            |            |            |            | —          |            |
| " <i>pallens</i> Bus.                         |            |            | —          | —          |            | —          |
| " <i>chirophylla</i> Bus.                     |            |            | —          | —          |            | —          |
| " <i>obovalis</i> Bus.                        |            |            |            |            | —          |            |
| " <i>glacialis</i> Bus.                       |            |            |            |            | —          |            |
| " <i>nitida</i> Bus.                          |            |            |            |            | o          |            |
| <i>Spiraea Ulmaria</i> und <i>Filipendula</i> |            |            | —          | —          |            |            |
| <i>Potentilla heptaphylla</i>                 |            |            | —          | —          |            |            |
| <i>Sanguisorba officinalis</i>                |            |            | —          |            |            |            |

Erklärung der Zeichen: + bedeutet positiver Erfolg; — bedeutet negativer Erfolg; o bedeutet Fremdinfection.

#### Ergebnis der Infektionsreihen 1—6.

1) Für die Ascosporen der *Sphaerotheca Humuli* auf *Alch. connivens* Bus. sind folgende Vulgares = species empfänglich: *Alch. connivens* Bus., *impexa* Bus. und *pastoralis* Bus. Unempänglich zeigte sich *Alch. demissa* Bus.

2) Die im Experimente verwendeten Arten der anderen Gruppen der Eu-Alchimillen: Pubescentes, Splendentes, Calicinae und Alpinae blieben für diese Ascosporeninfection unempänglich. 2 Arten: *Alch. Paicheana* Bus. und *nitida* Bus. hatten Fremdinfectionen.

3) Ebenso unempänglich verhielten sich 3 Gattungen der Rosaceen, von denen 2: *Spiraea* und *Sanguisorba* von Salmon (4) als Wirte der *Sphaerotheca Humuli* bezeichnet werden.

#### II. *Oldium* von *Alchimilla connivens* Bus. stammend.

(Das Material stammt von infizierten Topfpflanzen im Botan. Garten in Bern her.)

Reihe 7: Eingeleitet am 15. Mai 1907.

Um eine genaue Kontrolle bezüglich Fremdinfection zu haben, wurde in dieser Reihe das Sporenmaterial auf die Infektionsfläche in der Form eines Z aufgetragen.

Infektionspflanzen:

1. *Alchimilla connivens* Bus.
2. " *pastoralis* Bus.



**Beobachtungen:**

1) *Alchimilla connivens* Bus.: 17. Mai. Alle infizierten Blätter zeigen fast auf der ganzen Fläche Mycel. Entweder konnte die Infektionsfigur Z nicht genau aufgetragen werden, oder es liegt Fremdinfection vor. Das letztere ist wahrscheinlicher.

24. Mai. Alle Blätter sind stark und allgemein infiziert.

2) *Alchimilla pastoralis* Bus.: 17. Mai. Vollständig infektionsfrei.

24. Mai. 2 infizierte Blätter zeigen mit voller Deutlichkeit ein Z, dessen Fläche mit dichtem Mycel und Konidien bedeckt ist. Kontrollstellen frei.

Ein drittes infiziertes Blatt zeigt stellenweises Mycel, ohne Erkennung der Figur Z.

**Reihe 8:** Eingeleitet am 17. Mai 1907.

Das Sporenmaterial wurde hier in der Figur einer römischen II auf die Infektionsfläche aufgetragen.

Infektionspflanze: *Alchimilla pastoralis* Bus.

**Beobachtungen:**

24. Mai. Von 16 Blättern sind 5 infiziert worden. 4 der infizierten Blätter lassen deutlich die Infektionsfigur II erkennen, die durch leichtes Mycel und reichliche Konidienentwicklung gezeichnet ist. Ein infiziertes Blatt ist infektionsfrei. Kontrollstellen frei.

**Reihe 9:** Eingeleitet am 28. Mai 1907.

Als Infektionsfigur wurde auch in dieser Reihe eine römische II gewählt.

**Infektionspflanzen:**

**Vulgares:**

1. *Alch. pastoralis* Bus.

2. " *demissa* Bus.

**Pubescentes:**

3. *Alch. pubescens* Lam.

4. " *flabellata* Bus.

5. " *intermedia* Clairv.

**Splendentes:**

7. *Alch. Paicheana* Bus.

8. " *Faeroensis* Bus.

**Calicinae:**

9. *Alch. fallax* Bus.

10. " *acutiloba* Stev.

**Alpinae:**

11. *Alch. alpina* L. vera.

12. " *obovalis* Bus.

13. " *conjuncta* Bab.

14. " *grossidens* Bus.

15. " *glacialis* Bus.

**Bastarde:**

16. *Alch. glac.* × *pentaph.* = *trulata* Bus.

17. *Alch. glac.* × *pentaph.* = *gemmia* Bus.

**Beobachtungen:**

1) *Alch. pastoralis* Bus. 31. Mai. Die 2 Infektionsflächen zeigen leichtes Mycel.

1. Juni. Beide Infektionsflächen lassen Infektionsfigur deutlich erkennen: dichtes Mycel. Kontrollstellen frei.

2. Juni. Beobachtung wie am 1. Juni; Mycel greift über die Infektionsgrenzen hinaus. Keine Konidienbildung.

3. Juni. Mycel gleich 2. Juni. Konidien sehr spärlich. Kontrollstellen frei.

4. Juni. Beobachtung gleich 2. Juni. Konidienbildung etwas stärker. Eine Kontrollstelle zeigt schwache Fremdinfection.

5) *Alch. intermedia* Clairv. 31. Mai. 2 infizierte Stellen zeigen vereinzelte Mycelfäden. Ein infiziertes Blatt frei. Kontrollstellen frei.

1. Juni. 2 infizierte Stellen mit leichtem Mycel; eine infizierte Fläche frei, ebenso Kontrollstellen.

2. Juni. Mycel innerhalb zweier Infektionsflächen gut entwickelt; sonst wie am 1. Juni.

4. Juni. Infektionsflächen zeigen deutlich die Infektionsfigur II. Konidienbildung ziemlich spärlich. Eine infizierte Fläche frei; Kontrollstellen frei.

9) *Alchim. fallax* Bus. 31. Mai. Eine Infektionsstelle zeigt vereinzelte Mycelfäden; die anderen Infektionsstellen frei. Kontrollstellen frei.

4. Juni. Es ist keine Spur von Infektion zu bemerken. Die am 31. Mai beobachteten Mycelfäden sind verschwunden.

10) *Alchim. acutiloba* Stev. 1. Mai. Infektionsfrei.

4. Mai. Ein Blatt zeigt an 3 Infektionsstellen Mycel mit einigen Konidienträgern. Kontrollstellen infektionsfrei, ebenso 6 andere abgetrennte und unter feuchter Glasglocke aufbewahrte Blätter.

Die übrigen Versuchspflanzen bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes infektionsfrei.

Reihe 10: Eingeleitet am 6. Juni 1907.

Infektionspflanzen:

- Vulgares:  
 1. *Alch. connivens* Bus.  
 2. „ *crinita* Bus.  
 3. „ *micans* Bus.  
 4. „ *coriacea* Bus.  
 5. „ *multiflora* Bus.  
 6. „ *reniformis* Bus.  
 Calicinae:  
 7. *Alch. glaberrima* Schmidt  
 8. „ *incisa* Bus.  
 9. „ *firma* Bus.

10. *Alch. flexicaulis* Bus.  
 11. „ *acutiloba* Stev.  
 Pubescentes:  
 12. *Alch. Lapeyrousei* Bus.  
 13. „ *intermedia* Clairv.  
 Alpinae:  
 14. *Alch. alpina* L. vera.  
 15. „ *nitida* Bus.  
 16. „ *obovalis* Bus.  
 17. „ *Hoppeana* Rehb.

Anmerkung: In diesem Infektionsversuch wie auch in allen nachfolgenden Infektionsreihen wurde als Infektionsfläche keine willkürliche Figur, sondern ein besonderer, scharf umgrenzter Blattabschnitt oder Blattausschnitt gewählt.

Beobachtungen:

1) *Alchim. connivens* Bus. 10. Juni. Infektionsfrei.

11. Juni. 3 Infektionsstellen zeigen schwaches, allgemeines Mycel, mit einigen Konidienträgern. Eine Kontrollstelle trägt winzige Fremdinfection (ein paar Mycelfäden).

12. Juni. Alle Infektionsstellen tragen allgemeines Mycel mit ziemlich scharfer Begrenzung. Ein Infektionsblatt trägt an 3 Kontrollstellen ganz schwache Fremdinfectionen. Die anderen Blätter sind an den Kontrollstellen frei.

13. Juni. Die Infektionsstellen sind kräftig infiziert (starke Konidienbildung); allein die Fremdinfectionen haben sich auf fast alle Kontrollstellen ausgedehnt.

2) *Alchimilla crinita* Bus. 11. Juni. Infektionsfrei.

12. Juni. Eine Infektionsstelle zeigt einige Mycelfäden mit einigen Konidien. Kontrollstellen frei.

13. Juni. Gleiche Beobachtung wie am 12. Juni. Keine weitere Entwicklung der Infektion.

4) *Alchim. coriacea* Bus. 11. Juni. Eine Infektionsstelle zeigt stellenweises, ganz schwaches Mycel, das nicht über die Infektionsgrenzen hinausgeht. Kontrollstellen frei.

13. Juni. Beobachtung ergibt das gleiche Resultat wie am 11. Juni.

7) *Alchim. glaberrima* Schmidt. Sämtliche Blätter zeigen starke Fremdinfection, die eine Kontrolle verunmöglicht.

8) *Alch. incisa* Bus. Starke Fremdinfection. Kontrolle unmöglich.

9) *Alch. firma* Bus. Starke Fremdinfection. Kontrolle unmöglich.

10) *Alch. flexicaulis* Bus. Starke Fremdinfection. Kontrolle unmöglich.

Die übrigen Versuchspflanzen bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes infektionsfrei.

Reihe 11: Eingeleitet am 21. Juni 1907.

Infektionspflanzen:

| Vulgares:                          |  | Calicinae:                       |  |
|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 1. <i>Alch. connivens</i> Bus.     |  | 5. <i>Alch. flexicaulis</i> Bus. |  |
| 2. „ <i>impexa</i> Bus.            |  | 6. „ <i>fallax</i> Bus.          |  |
| 3. „ <i>alpestris</i> Schmidt      |  | 7. „ <i>firma</i> Bus.           |  |
| Pubescentes:                       |  | 8. „ <i>incisa</i> Bus.          |  |
| 4. <i>Alch. intermedia</i> Clairv. |  |                                  |  |

Beobachtungen: 23. Juni. Sporenkeimung auf Objektträger beobachtet.

1) *Alchim. connivens* Bus. 25. Juni. Infektionsfrei.

27. Juni. Von 3 infizierten Blättern hat ein Blatt an der Infektionsstelle allgemeines, scharf begrenztes Mycel. Eine Kontrollstelle dieses Blattes trägt kleine Fremdinfection (Konidienbildung). Die 2 anderen Infektionsblätter sind an den Infektionsstellen frei, zeigen aber auf Kontrollstellen schwache Fremdinfectionen.

28. Juni. Die infizierten Stellen sind überall schwächer infiziert als die Kontrollstellen. Trotz dieses Befundes wird eine positive Infektion angenommen, da die scharfe Begrenzung einer Infektionsstelle in Beobachtung vom 27. Juni diesen Schluß genügend begründet. Es muß ferner bemerkt werden, daß die 2 Blätter, die sich an den Infektionsstellen nicht infizierten, bald nach Beginn des Experimentes gelb und alt erschienen.

2) *Alchim. impexa* Bus. 25. Juni. Sämtliche Infektionsflächen zeigen allgemeines, scharf begrenztes Mycel. Kontrollstellen frei.

27. Juni. Das scharf begrenzte Mycel produziert an verschiedenen Stellen Konidien. Kontrollstellen frei.

28. Juni. Reichliche Konidienbildung, scharfe Begrenzung. Kontrollstellen frei.

3) *Alchim. alpestris* Schmidt. 25. Juni. Die Infektionsstellen sind frei, eine Kontrollstelle trägt schwache Fremdinfection.

27. Juni. Ein Infektionsblatt trägt an Infektionsstelle allgemeines, scharf begrenztes Mycel; Kontrollstellen dieses Blattes frei. Ein zweites infiziertes Blatt zeigt innerhalb Infektionsstelle stellenweises Mycel; Kontrollstellen tragen weit vorgeschrittene, scharf lokalisierte Fremdinfection. 4 nicht infizierte Blätter mit schwachen Fremdinfectionen.

28. Juni. Beobachtung gleich der vom 27. Juni. Es wird, gestützt auf Beobachtung vom 27. Juni (scharfe Begrenzung der Infektionsstelle, freie Kontrollstellen), eine positive Infektion angenommen.

4) *Alchim. intermedia* Clairv. 25. Juni. Infektionsstellen wie Kontrollstellen tragen ziemlich starke Fremdinfectionen.

27. Juni. Gleiche Beobachtung wie am 25. Juni.

5) *Alchim. flexicaulis* Bus. 25. Juni. Eine Infektionsstelle

zeigt allgemeines, scharf begrenztes Mycel. Kontrollstellen dieses Blattes frei. 2 andere Infektionsblätter frei.

27. Juni. Von den 3 infizierten Blättern trägt eines an Infektionsstelle allgemeines, scharf begrenztes Mycel, schwache Konidienbildung; Kontrollstellen dieses Blattes frei. Die 2 anderen Infektionsblätter sind frei; beide erscheinen als im Absterben begriffen. Ein nicht infiziertes Blatt frei.

28. Juni. Gleiche Beobachtung wie am 27. Juni.

6) *Alch. fallax* Bus. 25. Juni. Infektionsfrei.

27. Juni. Von 6 Blättern wurden 3 infiziert. Ein Infektionsblatt zeigt an Kontrollstelle winzige Fremdinfectionen. Alle anderen Blätter frei.

28. Juni. Beobachtung gleich der vom 27. Juni.

7) *Alchim. firma* Bus. 25. Juni. Infektionsstellen und Kontrollstellen tragen starke Fremdinfectionen. Kontrolle unmöglich.

8) *Alchim. incisa* Bus. 25. Juni. Von 5 Infektionsblättern sind 4 abgestorben. Das 5. zeigt auf Kontrollstellen Fremdinfection, während die Infektionsstelle frei ist.

27. Juni. Gleiche Beobachtung wie am 25. Juni.

28. Juni. Gleiche Beobachtung wie am 25. Juni.

**Reihe 12:** Eingeleitet am 3. Sept. 1907.

Infektionspflanzen:

| Vulgares:                      |  | Alpinae:                        |  |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 1. <i>Alch. connivens</i> Bus. |  | 4. <i>Alch. alpina</i> L. vera. |  |
| 2. „ <i>multiflora</i> Bus.    |  | 5. „ <i>nitida</i> Bus.         |  |
| Pentaphyllae:                  |  | 6. „ <i>grossidens</i> Bus.     |  |
| 3. <i>Alch. pentaphylla</i> L. |  | 7. „ <i>obovalis</i> Bus.       |  |
|                                |  | 8. „ <i>glacialis</i> Bus.      |  |

Beobachtungen:

1) *Alchim. connivens* Bus. 9. Sept. 2 Infektionsblätter wurden an 2 Stellen infiziert. Beide Infektionsstellen tragen stellenweises Mycel, ohne Konidien. Infektionsgrenzen sind scharf gezeichnet. Kontrollstellen frei.

11. Sept. Beide Infektionsflächen zeigen allgemeines, scharf begrenztes Mycel; schwache, aber allgemeine Konidienbildung. Kontrollstellen frei.

13. Sept. Beobachtung gleich derjenigen vom 11. Sept.

8) *Alchim. glacialis* Bus. 9. Sept. Von 3 infizierten Blättern zeigt ein Blatt Fremdinfection. Dieses Blatt wird ausgeschaltet.

13. Sept. Die 2 übrig gebliebenen Blätter sind vollständig infektionsfrei.

Alle übrigen Infektionspflanzen bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes vollständig infektionsfrei.

(Siehe Tabelle p. 15.)

**Ergebnis der Infektionsreihen 7–12.**

1) Die zu den Vulgares gehörigen Species: *Alch. connivens* Bus., *impexa* Bus., *alpestris* Schmidt, *pastoralis* Bus., *crinita* Bus. und *coriacea* Bus. wurden durch das *Oidium* auf *Alch. connivens* infiziert. Nicht infiziert wurden die Species: *Alch. reniformis* Bus., *micans* Bus., *demissa* Bus. und *multiflora* Bus. Diese negativen Resultate sind wegen der kleinen Zahl der bezüglichen Experimente nur bedingt beweisend.

2) Die Gruppe der Pubescentes verhielt sich unempfindlich, mit

Tabelle zu den Versuchsreihen 7—12,  
ausgeführt mit Konidien von *A. connivens* stammend.

| Infektionspflanzen   | Reihe<br>7 | Reihe<br>8 | Reihe<br>9 | Reihe<br>10 | Reihe<br>11 | Reihe<br>12 |
|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Vulgares: Alch. <i>connivens</i> Bus.  | o          |            |            | +           | +           | +           |
| „ <i>impexa</i> Bus.   |            |            |            |             | +           |             |
| „ <i>alpestris</i> Schmidt   |            |            |            |             | +           |             |
| „ <i>reniformis</i> Bus.   |            |            |            | —           |             |             |
| „ <i>pastoralis</i> Bus.   | +          | +          | +          |             |             |             |
| „ <i>crinita</i> Bus.  |            |            |            | +           |             |             |
| „ <i>micans</i> Bus.   |            |            |            | —           |             |             |
| „ <i>coriacea</i> Bus.   |            |            |            | +           |             |             |
| „ <i>demissa</i> Bus.  |            |            | —          |             |             |             |
| „ <i>multiflora</i> Bus.   |            |            |            | —           |             | —           |
| Pubescentes: Alch. <i>pubescens</i> Lam.   |            |            | —          |             |             |             |
| „ <i>flabellata</i> Bus.   |            |            | —          |             |             |             |
| „ <i>intermedia</i> Clairv.  |            |            | +          | —           | o           |             |
| „ <i>Lapeyrousei</i> Bus.  |            |            |            | —           |             |             |
| Calicinae: Alch. <i>glaberrima</i> Schmidt   |            |            |            | o           |             |             |
| „ <i>incisa</i> Bus.   |            |            |            | o           |             |             |
| „ <i>fallax</i> Bus.   |            |            | ?          |             | —           |             |
| „ <i>flexicaulis</i> Bus.  |            |            |            | o           | +           |             |
| „ <i>firma</i> Bus.  |            |            |            | o           | o           |             |
| „ <i>acutiloba</i> Stev.   |            |            | +          | —           |             |             |
| Splendentes: Alch. <i>Faerøensis</i> Bus.  |            |            | —          |             |             |             |
| „ <i>Paicheana</i> Bus.  |            |            | —          |             | •           |             |
| Alpinae: Alch. <i>alpina</i> L. vera   |            |            | —          | —           |             | —           |
| „ <i>Hoppeana</i> Rchbg.   |            |            | —          | —           |             |             |
| „ <i>grossidens</i> Bus.   |            |            | —          |             |             | —           |
| „ <i>conjuncta</i> Bab.  |            |            | —          |             |             | —           |
| „ <i>obovalis</i> Bus.   |            |            | —          | —           |             | —           |
| „ <i>glacialis</i> Bus.  |            |            | —          |             |             | —           |
| „ <i>nitida</i> Bus.   |            |            |            | —           |             | —           |
| Pentaphyllae: Alch. <i>pentaphylla</i> L.  |            |            |            |             |             | —           |
| Bastarde: Alch. <i>gemmia</i> und <i>trul-</i><br><i>lata</i> Bus. (pentaph. ×<br><i>glacialis</i> ) |            |            | —          |             |             | —           |

Erklärung der Zeichen: + bedeutet positiver, — negativer, ? zweifelhafter Erfolg; o bedeutet Fremdinfection.

Ausnahme der Alch. *intermedia* Clairv., deren Infektion als sicher angenommen werden kann, obschon sich diese Art einmal als unempfindlich erwies. Der positive Erfolg in der Reihe 9 hat größere Beweiskraft als der negative in der Reihe 10.

3) Die Calicinae zeigen auffallend viele Fremdinfectionen. Diese weisen a priori auf eine große Empfänglichkeit dieser Gruppe hin. Auf der anderen Seite erschwerten diese Fremdinfectionen die Experimente ganz außerordentlich, so daß die Infektionsversuche mit den hierher gehörigen Arten auch später ziemlich spärliche Resultate lieferten. Für das vorliegende Oidium ist die Empfänglichkeit der Species Alch. *flexicaulis* Bus. und *acutiloba* Stev. als bewiesen anzunehmen. Dieses Resultat, wie auch die Infektion der Alch. *intermedia* Clairv. (Pubescentes) ist bemerkenswert, weil sich Arten, die systematisch der Alch. *connivens* näher stehen, immun verhielten.

4) Die Splendentes, Alpinae, Pentaphyllae und die Bastarde (Pentaphyllae × Alpinae) erwiesen sich als immun.

5) Die Versuche mit dem Oidium auf Alchim. *connivens* Bus. (Reihen 7—12) und den Peritheciën auf derselben Wirtspflanze (Reihen

1—6) zeigen keine vollständige Parallele. Für die Ascosporen blieben *Alchim. intermedia* (Pub.) und *Alch. acutiloba* (Calicinae) unempfindlich, für die Konidien waren diese Arten empfindlich. Es ist aber hervorzuheben, daß sich diese Species in den Versuchen mit dem *Oidium* wechselnd verhielten, indem beide Arten das eine Mal ein positives, das andere Mal ein negatives Infektionsresultat lieferten. Infolgedessen darf auf das negative Verhalten dieser Species für die Ascosporen kein allzu großes Gewicht gelegt werden. In allen anderen Fällen deckt sich die Empfindlichkeit der Wirtspflanzen für die Ascosporeninfektion vollständig mit der für die Konidieninfektion. Auf keinen Fall zeigten die Ascosporen einen größeren Infektionskreis als das *Oidium*. Dieser Befund setzt sich also in Uebereinstimmung mit den Resultaten von Marchal und Salmon (p. 2, 3), in Gegensatz zu der im allgemeinen Teile erwähnten Negerschen Annahme.

### III. *Oidium* von *Alchimilla pastoralis* Bus. stammend.

(Das Material stammt her von infizierten Topfpflanzen im Botanischen Garten in Bern.)

Reihe 13: Eingeleitet am 10. Juni 1907.

Infektionspflanzen:

| Vulgares:                       |  | Calicinae:                          |  |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1. <i>Alch. pastoralis</i> Bus. |  | 10. <i>Alch. glaberrima</i> Schmidt |  |
| 2. " <i>crinita</i> Bus.        |  | 11. " <i>incisa</i> Bus.            |  |
| 3. " <i>micans</i> Bus.         |  | 12. " <i>fallax</i> Bus.            |  |
| 4. " <i>alpestris</i> Schmidt   |  | Pubescentes:                        |  |
| 5. " <i>connivens</i> Bus.      |  | 13. <i>Alch. pubescens</i> Lam.     |  |
| 6. " <i>reniformis</i> Bus.     |  | 14. " <i>flabellata</i> Bus.        |  |
| 7. " <i>coriacea</i> Bus.       |  | 15. " <i>sericata</i> Rchbg.        |  |
| 8. " <i>demissa</i> Bus.        |  | 16. " <i>intermedia</i> Clairv.     |  |
| 9. " <i>impexa</i> Bus.         |  | Alpinae:                            |  |
|                                 |  | 17. <i>Alch. alpina</i> L. vera     |  |
|                                 |  | 18. " <i>Hoppeana</i> Rchbg.        |  |
|                                 |  | 19. " <i>nitida</i> Bus.            |  |

Beobachtungen:

1) *Alchim. pastoralis* Bus. 13. Juni. Von 3 infizierten Blättern zeigt ein Blatt an der Infektionsstelle gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel. Kontrollstellen dieses Blattes frei. Ein zweites Infektionsblatt ist infektionsfrei, während das dritte Fremdinfection zeigt. Dieses letztere wird entfernt.

14. Juni. Beide Infektionsstellen tragen gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel. Kontrollstellen frei.

16. Juni. Beide Infektionsflächen zeigen scharf begrenztes Mycel, Konidienbildung; 2 Kontrollstellen tragen winzige Fremdinfectionen.

17. Juni. Gleiche Beobachtung wie am 16. Juni.

2) *Alchimilla crinita* Bus. 13. Juni. Infektionsfrei.

14. Juni. Alle Infektionsstellen zeigen schwaches, gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel. Kontrollstellen frei.

16. Juni. Gleiche Beobachtung wie am 14. Juni. Stärkeres Mycel.

17. Juni. Blätter sind im Absterben begriffen, weshalb Infektion keine Fortschritte gemacht hat.

3) *Alchimilla micans* Bus. 13. und 14. Juni. Infektionsfrei.

16. Juni. Alle Infektionsstellen zeigen scharf begrenztes, gleichmäßiges, starkes Mycel. Kontrollstellen frei.

17. Juni. Gleiche Beobachtung wie am 16. Juni; Konidienbildung.

4) *Alchim. alpestris* Schmidt. 13. Juni. Die infizierten Stellen tragen scharf begrenztes, schwaches Mycel. Kontrollstellen frei.

14. Juni. Stärkeres Mycel als am 13. Juni, scharfe Begrenzung, Kontrollstellen frei.

16. Juni. Wie am 14. Juni. Konidienbildung.

5) *Alchim. connivens* Bus. 13. Juni. Eine Infektionsstelle zeigt ganz schwaches, stellenweises Mycel. Die anderen infizierten Stellen, wie die Kontrollstellen, frei.

14. Juni. Eine Infektionsstelle trägt schwaches Mycel, das nicht über die Infektionsgrenzen hinausgeht; eine Kontrollstelle dieses Blattes zeigt ziemlich starke Fremdinfection. Die anderen infizierten Stellen, wie Kontrollstellen, frei. Alle Blätter leiden unter Fäulnis.

16. Juni. Beobachtung gleich derjenigen vom 14. Juni.

17. Juni. Blätter sind abgestorben. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

7) *Alchim. coriacea* Bus. 13. Juni. Von 2 infizierten Blättern zeigt ein Blatt an der Infektionsstelle gleichmäßiges, scharf begrenztes, ziemlich dichtes Mycel; das 2. Blatt trägt nur stellenweises Mycel, das sich aber genau an die Infektionsgrenzen hält. Kontrollstellen dieser beiden Blätter frei. Ein 3. nicht infiziertes Blatt zeigt kleine Fremdinfection.

14. Juni. Gleiche Beobachtung wie am 13. Juni.

16. Juni. Beide Infektionsstellen mit dichtem, gleichmäßigem Mycel, Kontrollstellen dieser Blätter frei. Das 3., nicht infizierte Blatt, mit starker Fremdinfection.

16. Juni. Gleiche Beobachtung wie am 16. Juni. Konidienbildung.

9) *Alchim. impexa* Bus. 13. Juni. Alle Infektionsstellen zeigen starkes, gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel. Kontrollstellen frei. Die Infektion ist bedeutend stärker als die der eigenen Wirtspflanze *Alch. pastoralis* Bus.

14. Juni. Gleiche Beobachtung wie am 13. Juni. Konidienbildung.

16. Juni. Starke Konidienbildung, scharfe Grenzen; Kontrollstellen frei.

17. Juni. Wie am 16. Juni.

10) *Alchim. glaberrima* Schmidt. 13. Juni. Fremdinfection verunmöglicht jede Kontrolle.

11) *Alchim. incisa* Bus. 14. Juni. Die Infektionsstellen sind frei; einige Kontrollstellen tragen schwache Fremdinfection.

16. Juni. Die Infektionsstellen tragen schwaches, stellenweises Mycel. Die Infektionsgrenzen sind deutlich zu erkennen. Kontrollstellen tragen schwache Fremdinfection.

17. Juni. Gleiche Beobachtung wie am 16. Juni; Mycel der Infektionsstellen stärker entwickelt. Die Infektion wird als zweifelhaft bezeichnet.

12) *Alchim. fallax* Bus. 14. Juni. Die Infektionsstelle trägt ganz schwaches, scharf begrenztes Mycel; eine Kontrollstelle mit kleiner, aber weit vorgeschrittener Infektion.

16. Juni. Die Infektionsfläche trägt gleichmäßiges, ziemlich dichtes Mycel, das ziemlich scharf begrenzt ist. Die Fremdinfection auf der Kontrollstelle hat sich stärker entwickelt.

17. Juni. Beobachtung gleich der vom 16. Juni. Die Infektion wird als zweifelhaft bezeichnet.

13) *Alchim. pubescens* Lam. 14. Juni. Fremdinfection macht Kontrolle unmöglich.

16) *Alchim. intermedia* Clairv. 14. Juni. Alle Infektionsstellen zeigen gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel; Kontrollstellen frei.

16. Juni. Die Infektionsstellen tragen dichtes, scharf begrenztes Mycel, schwache Konidienbildung. Kontrollstellen frei.

17. Juni. Gleiche Beobachtung wie am 16. Juni.

Die folgenden Infektionspflanzen: *Alchim. reniformis* Bus., *demissa* Bus., *flabellata* Bus., *sericata* Rchbg., *alpina* L. vera, *Hoppeana* Rchbg., *nitida* Bus. bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes vollständig infektionsfrei.

Reihe 14: Eingeleitet am 13. Juni 1907.

Infektionspflanzen (alles Topfpflanzen im Alter von 3 bis 5 Wochen):

- |                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| *1. <i>Alchimilla pastoralis</i> Bus. | *6. <i>Viola canina</i> L.       |
| *2. <i>Erodium moschatum</i> L.       | 7. <i>Plantago montana</i> Lam.  |
| 3. <i>Fragaria vesca</i> L.           | 8. „ <i>serpentina</i> Vill.     |
| *4. <i>Potentilla glandulosa</i>      | *9. <i>Humulus japonicus</i>     |
| *5. <i>Rubus odoratus</i>             | *10. <i>Geranium pratense</i> L. |

Anmerkung: Die mit \* bezeichneten Infektionspflanzen sind nach Salmon (4) Wirtspflanzen der *Sphaerotheca Humuli*.

Kontrollpflanzen wurden gleichzeitig unter gleiche Bedingungen gebracht.

Beobachtungen: 15. Juni. Sporenkeimung auf Objektträger beobachtet.

1) *Alchimilla pastoralis* Bus. 17. Juni. Fast alle Blätter zeigen schwaches Mycel. Kontrollexemplar frei.

18. Juni. Alle Blätter tragen dichtes Mycel; Kontrollexemplar frei.

19. Juni. Gleiche Beobachtung wie am 18. Juni, Konidienbildung. Das Kontrollexemplar zeigt an einem Blatt kleine, schwache Fremdinfection.

22. Juni. Alle Blätter und Blattstiele sind stark infiziert und tragen pulverige Sporenmassen. Kontrollexemplar zeigt schwache Infektion, die seit dem 19. Juni keine nennenswerten Fortschritte gemacht hat.

2. Juli. Infektionsexemplar und Kontrollexemplar wie am 22. Juni.

Alle übrigen Versuchspflanzen, wie Kontrollpflanzen, bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes vollständig infektionsfrei.

Reihe 15: Eingeleitet am 4. Juli 1907.

Infektionspflanzen:

- | Vulgares:                       | Pubescentes:                    |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. <i>Alch. pastoralis</i> Bus. | 11. <i>Alch. pubescens</i> Lam. |
| 2. „ <i>crinita</i> Bus.        | 12. „ <i>sericata</i> Rchbg.    |
| 3. „ <i>micans</i> Bus.         | Alpinæ:                         |
| 4. „ <i>connivens</i> Bus.      | 13. <i>Alch. alpina</i> L. vera |
| 5. „ <i>impexa</i> Bus.         | 14. „ <i>Hoppeana</i> Rchbg.    |
| 6. „ <i>reniformis</i> Bus.     | 15. „ <i>nitida</i> Bus.        |
| 7. „ <i>coriacea</i> Bus.       | 16. „ <i>grossidens</i> Bus.    |
| 8. „ <i>multiflora</i> Bus.     | 17. „ <i>obovalis</i> Bus.      |
| Calicinae:                      |                                 |
| 9. <i>Alch. fallax</i> Bus.     |                                 |
| 10. „ <i>flexicaulis</i> Bus.   |                                 |



### Beobachtungen:

1) *Alchimilla pastoralis* Bus. 8. Juli. Von 5 Blättern wurden 3 infiziert (5, 3i)<sup>1)</sup>. Ein Infektionsblatt ist abgestorben. Die beiden anderen tragen an den Infektionsflächen gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel. Kontrollstellen frei.

10. Juli. Beobachtung gleich derjenigen vom 8. Juli.

12. Juli. Die Infektionsstellen zeigen scharf begrenztes, dichtes Mycel mit Konidienbildung. Kontrollstellen frei.

2) *Alchim. crinita* Bus. 8. Juli. (3, 3i). 2 Infektionsblätter tragen scharf begrenztes, gleichmäßiges Mycel. Ein Infektionsblatt ist noch frei. Kontrollstellen frei.

10. Juli. Alle Infektionsstellen mit scharf begrenztem, gleichmäßigem Mycel. Kontrollstellen frei.

12. Juli. Gleiche Beobachtung wie am 10. Juli. Konidienbildung.

3) *Alchim. micans* Bus. 8. Juli. (4, 3i). Infektionsfrei.

10. Juli. Alle Infektionsstellen tragen stellenweises Mycel, das die Infektionsgrenzen ziemlich scharf zeichnet. Auf Kontrollstellen sind viele kleine Fremdinfectionen.

12. Juli. Beobachtung gleich derjenigen vom 10. Juli. Die Fremdinfectionen haben sich stärker entwickelt, so daß die Infektion als zweifelhaft bezeichnet werden muß.

4) *Alchim. connivens* Bus. 8. Juli. (1, 1i). Das infizierte Blatt wurde an 2 verschiedenen Stellen infiziert. Beide tragen schwaches, scharf begrenztes Mycel. Eine Kontrollstelle trägt winzige Fremdinfection.

10. Juli. Beide Infektionsstellen tragen scharf begrenztes, gleichmäßiges, dichtes Mycel. 2 Kontrollstellen haben winzige Fremdinfectionen.

12. Juli. Wie am 10. Juli. Konidienbildung. Es wird positive Infektion angenommen.

5) *Alchim. impexa* Bus. 8. Juli. (3, 2i). Eine Infektionsstelle trägt gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel; die andere ist nur stellenweise infiziert. Kontrollstellen frei.

10. Juli. Beide Infektionsstellen mit dichtem, scharf begrenztem Mycel; Kontrollstellen frei.

12. Juli. Gleiche Beobachtung wie am 10. Juli. Konidienbildung.

6) *Alchim. reniformis* Bus. 10. Juli. Fremdinfectionen verunmöglichen die Kontrolle.

7) *Alchim. coriacea* Bus. 10. Juli. Fremdinfectionen verunmöglichen die Kontrolle.

9) *Alchim. fallax* Bus. 8. Juli. (7, 4i). Alle Blätter, bis auf ein Infektionsblatt, sind im Absterben begriffen und infektionsfrei. Das gesund gebliebene Blatt trägt an der Infektionsstelle scharf begrenztes, gleichmäßiges Mycel. Kontrollstellen dieses Blattes frei.

10. und 12. Juli. Gleiche Beobachtung wie am 8. Juli. Konidienbildung. Es wird positive Infektion angenommen.

10) *Alchim. flexicaulis* Bus. 8. Juli. (2, 2i). Eine Infektionsstelle ist gleichmäßig und mit scharfen Grenzen infiziert, die andere Infektionsstelle frei. Kontrollstellen frei.

1) Zur Abkürzung wird zukünftig dieser Klammerausdruck gebraucht; die erste Zahl der Einklammerung gibt die Zahl der im Experimente verwendeten Blätter an, die zweite Zahl, mit „i“ versehen, bezeichnet die Anzahl der Blätter, auf denen Sporen ausgesät wurden.

10. und 12. Juli. Eine Infektionsstelle trägt gleichmäßiges, die andere Infektionsstelle stellenweises Mycel. Scharfe Grenzen. Kontrollstellen frei. Konidienbildung.

11) *Alchim. pubescens* Lam. 10. Juli. Fremdinfectionen verunmöglichen die Kontrolle.

13) *Alchim. alpina* L. vera. 8. und 10. Juli (6, 3i). Infektionsfrei.

12. Juli. Ein Infektionsblatt wurde an 3 Blattlappen infiziert. Einer dieser Blattlappen zeigt eine Gruppe von Konidien. Mycel ist der Behaarung des Blattes wegen keines zu sehen. Die 2 anderen Blattlappen sind infektionsfrei, ebenso die Kontrollstellen dieses Blattes. Die anderen Infektionsblätter, wie 3 Kontrollblätter, sind ebenfalls infektionsfrei.

15. Juli. Gleiche Beobachtung wie am 12. Juni. Der infizierte Blattlappen zeigt vermehrte Konidienbildung. Die Infektion wird als „zweifelhaft“ bezeichnet, weil hier der Behaarung wegen keine Infektionsgrenzen zu erkennen sind, und weil von 3 Infektionsblättern nur ein einziger Blattlappen sich infizierte.

15) *Alchim. nitida* Bus. 8. und 10. Juli. Infektionsfrei.

12. Juli. (5, 4i). 4 Blätter sind im Absterben begriffen und infektionsfrei. Ein Infektionsblatt ist noch frisch grün; dieses trägt an einem infizierten Blattlappen eine Gruppe von Konidien. Ein zweiter infizierter Blattlappen dieses Blattes frei, ebenso die Kontrollstellen.

15. Juli. Die Infektion entwickelt sich kräftig, sonst gleiche Beobachtung wie am 12. Juli. Die Infektion wird aus den gleichen Gründen wie bei *Alch. alpina* L. vera als „zweifelhaft“ bezeichnet.

Folgende Infektionspflanzen bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes vollständig infektionsfrei: *Alchimilla multiflora* Bus., *Alchim. sericata* Rchbg., *Alchim. Hoppeana* Rchbg., *Alchim. grossidens* Bus., *Alchim. obovalis* Bus.

**Reihe 16: Eingeleitet am 17. Juli 1907.**

**Infektionspflanzen:**

| Vulgares:                           |  | Pubescentes:                    |  |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 1. <i>Alch. pastoralis</i> Bus.     |  | 16. <i>Alch. pubescens</i> Lam. |  |
| 2. „ <i>crinita</i> Bus.            |  | 17. „ <i>flabellata</i> Bus.    |  |
| 3. „ <i>micans</i> Bus.             |  | 18. „ <i>sericata</i> Rchbg.    |  |
| 4. „ <i>connivens</i> Bus.          |  | 19. „ <i>intermedia</i> Clairv. |  |
| 5. „ <i>impexa</i> Bus.             |  | Alpinae:                        |  |
| 6. „ <i>reniformis</i> Bus.         |  | 20. <i>Alch. alpina</i> L. vera |  |
| 7. „ <i>versipila</i> Bus.          |  | 21. „ <i>Hoppeana</i> Rchbg.    |  |
| 8. „ <i>coriacea</i> Bus.           |  | 22. „ <i>grossidens</i> Bus.    |  |
| 9. „ <i>multiflora</i> Bus.         |  | 23. „ <i>conjuncta</i> Bab.     |  |
| Splendentes:                        |  | 24. „ <i>nitida</i> Bus.        |  |
| 10. <i>Alch. Faeroensis</i> Bus.    |  | 25. „ <i>pallens</i> Bus.       |  |
| Calicinae:                          |  | 26. „ <i>chirophylla</i> Bus.   |  |
| 11. <i>Alch. glaberrima</i> Schmidt |  | 27. „ <i>obovalis</i> Bus.      |  |
| 12. „ <i>flexicaulis</i> Bus.       |  | 28. „ <i>glacialis</i> Bus.     |  |
| 13. „ <i>fallax</i> Bus.            |  | 29. „ <i>alpigena</i> Bus.      |  |
| 14. „ <i>incisa</i> Bus.            |  |                                 |  |
| 15. „ <i>firma</i> Bus.             |  |                                 |  |

**Beobachtungen:** 18. Juli. Sporenkeimung auf Objektträger beobachtet.

1) *Alchim. pastoralis* Bus. 22. Juli. (2, 1i). Die Infektionsstelle zeigt gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel. Kontrollstellen frei.

23. Juli. Gleiche Beobachtung wie am 22. Juni. Die Infektion muß als schwach bezeichnet werden.

26. Juli. Es ist fast keine Entwicklung der Infektion zu konstatieren. Aeüßerst geringe Konidienbildung; Kontrollstellen frei.

2) *Alchim. crinita* Bus. 22. Juli. (5, 4i). Sämtliche Infektionsstellen tragen gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel. Kontrollstellen frei.

23. Juli. Gleiche Beobachtung wie am 22. Juli.

26. Juli. Die Infektionsstellen sind mit scharfen Grenzen infiziert. Mittelstarke Konidienbildung.

3) *Alchim. micans* Bus. 22. Juli. Sämtliche Infektionsstellen sind gleichmäßig und mit scharfen Grenzen infiziert. Eine Kontrollstelle trägt Fremdinfektion; die übrigen Kontrollstellen frei.

23. Juli. Gleiche Beobachtung wie am 22. Juli.

26. Juli. Sämtliche Infektionsstellen sind mit scharfen Grenzen infiziert. Mittelstarke Konidienbildung. Eine Kontrollstelle mit kleiner Fremdinfektion; die übrigen Kontrollstellen frei. Es wird positive Infektion angenommen.

4) *Alchim. connivens* Bus. 22. Juli. (2, 2i). Beide Infektionsstellen tragen gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel. Dagegen zeigen einige Kontrollstellen winzige Fremdinfektionen.

23. Juli. Die Infektionsstellen sind mit scharfen Grenzen infiziert, Konidienbildung. Die Fremdinfektionen auf den Kontrollstellen haben sich nicht stärker entwickelt.

26. Juli. Gleiche Beobachtung wie am 23. Juli. Starke Konidienbildung. Es wird positive Infektion angenommen.

5) *Alchimilla impexa* Bus. 22. Juli. (3, 3i). Die Infektionsstellen sind mit dichtem, scharf begrenztem Mycel versehen. Kontrollstellen frei.

23. Juli. Gleiche Beobachtung wie am 22. Juli. Mittelstarke Konidienbildung.

6) *Alchim. reniformis* Bus. 23. Juli. Fremdinfektionen verunmöglichen die Kontrolle.

7) *Alchim. versipila* Bus. 22. Juli. Fremdinfektionen verunmöglichen die Kontrolle.

8) *Alchim. coriacea* Bus. 22. Juli. (2, 2i). Beide Infektionsstellen tragen gleichmäßiges, ziemlich scharf begrenztes Mycel. Kontrollstellen zeigen einige kleine Fremdinfektionen.

23. Juli. Die sehr stark entwickelten Fremdinfektionen machen Kontrolle unmöglich. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

10) *Alchim. Faeroensis* Bus. 22. Juli. Fremdinfektionen verunmöglichen die Kontrolle.

11) *Alchim. glaberrima* Schmidt. 22. Juli. Fremdinfektionen verunmöglichen die Kontrolle.

12) *Alchim. flexicaulis* Bus. 22. Juli. (1, 1i). Die Infektionsstelle trägt gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel. Eine Kontrollstelle trägt kleine Fremdinfektion.

23. Juli. Gleiche Beobachtung wie am 22. Juli. Konidienbildung. Es wird positive Infektion angenommen.

13) *Alchim. fallax* Bus. 22. Juli. Fremdinfektionen verunmöglichen die Kontrolle.

14) *Alchim. incisa* Bus. 22. Juli. Fremdinfektionen verunmöglichen die Kontrolle.

15) *Alchim. firma* Bus. 22. Juli. (4, 3i). Sämtliche Infektionsstellen tragen gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel. Ein Infektionsblatt

trägt auf seinen Kontrollstellen 2 kleine Fremdinfektionen. Die übrigen Kontrollstellen frei.

23. Juli. Ein Infektionsblatt ist gleichmäßig und mit scharfen Grenzen infiziert. Kontrollstellen dieses Blattes frei. Die 2 anderen Infektionsblätter zeigen ebenfalls gleichmäßiges Mycel an den Infektionsstellen. Allein Fremdinfektionen haben sich ziemlich stark auf den Kontrollstellen angesiedelt, so daß die Infektionsgrenzen unscharf sind. Gestützt auf das erste Infektionsblatt wird positive Infektion angenommen.

16) *Alchim. pubescens* Lam. 23. Juli. Fremdinfektionen verunmöglichen die Kontrolle.

17) *Alchim. flabellata* Bus. 23. Juli. Fremdinfektionen verunmöglichen die Kontrolle.

19) *Alchim. intermedia* Clairv. 22. Juli. Fremdinfektionen verunmöglichen die Kontrolle.

22) *Alchim. grossidens* Bus. 22. Juli. Fremdinfektionen verunmöglichen die Kontrolle.

Die folgenden Infektionspflanzen bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes vollständig infektionsfrei: *Alch. multiflora* Bus., *Alch. sericata* Rchbg., *Alch. alpina* L. vera, *Alch. Hoppeana* Rchbg., *Alch. conjuncta* Bab., *Alch. nitida* Bus., *Alch. pallens* Bus., *Alch. chirophylla* Bus., *Alch. obovalis* Bus., *Alch. glacialis* Bus. und *Alch. alpigena* Bus.

**Reihe 17: Eingeleitet am 8. Aug. 1907:**

**Infektionspflanzen:**

| Vulgares:                       |  | Alpinae:                       |  |
|---------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 1. <i>Alch. pastoralis</i> Bus. |  | 7. <i>Alch. alpina</i> L. vera |  |
| 2. „ <i>micans</i> Bus.         |  | 8. „ <i>grossidens</i> Bus.    |  |
| 3. „ <i>multiflora</i> Bus.     |  | 9. „ <i>conjuncta</i> Bab.     |  |
| Pubescentes:                    |  | 10. „ <i>chirophylla</i> Bus.  |  |
| 4. <i>Alch. pubescens</i> Lam.  |  | 11. „ <i>obovalis</i> Bus.     |  |
| Calicinae:                      |  | 12. „ <i>alpigena</i> Bus.     |  |
| 5. <i>Alch. fallax</i> Bus.     |  | 13. „ <i>nitida</i> Bus.       |  |
| 6. „ <i>flexicaulis</i> Bus.    |  | 14. „ <i>pallens</i> Bus.      |  |
|                                 |  | 15. „ <i>glacialis</i> Bus.    |  |

**Beobachtungen: 12. Aug. Keimung auf Objektträger beobachtet.**

1) *Alchimilla pastoralis* Bus. 12. Aug. (2, 2i). Eine Infektionsstelle trägt stellenweises Mycel, das nicht über die Infektionsstelle hinausgeht. Die andere Infektionsstelle, wie die Kontrollstellen, frei.

14. Aug. Beide Infektionsstellen sind gleichmäßig und mit scharfer Begrenzung infiziert. Kontrollstellen frei.

19. Aug. Gleiche Beobachtung wie am 14. Aug. Starke Konidienbildung.

2) *Alchim. micans* Bus. 12. Aug. (3, 3i). 2 Infektionsstellen tragen schwaches, gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel, Kontrollstellen frei. Das 3. Infektionsblatt ist an Kontroll- wie an Infektionsstelle frei.

14. Aug. Gleiche Beobachtung wie am 12. Aug.

16. Aug. Scharf begrenzte, gleichmäßige Infektion, Konidienbildung. Eine Kontrollstelle mit kleiner Fremdinfektion.

4) *Alchim. pubescens* Lam. 12. Aug. (2, 2i). Infektionsfrei.

14. Aug. Eine Infektionsfläche ist teilweise abgestorben, der gesunde Teil trägt einige Mycelfäden. Die andere Infektionsstelle ist frei, ebenso sämtliche Kontrollstellen.

16. Aug. Beide Infektionsblätter sind abgestorben. Die Infektion wird als „zweifelhaft“ bezeichnet.

5) *Alchim. fallax* Bus. 12. Aug. (3, 3i). Infektionsfrei.

14. Aug. 2 Infektionsstellen tragen gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel; die 3. Infektionsstelle ist frei, ebenso sämtliche Kontrollstellen.

16. Aug. Eine Infektionsstelle zeigt dichtes, scharf begrenztes Mycel, keine Konidienbildung. Die 2 anderen Infektionsstellen sind schwächer infiziert, tragen aber vereinzelte Konidien. Kontrollstellen frei.

6) *Alchim. flexicaulis* Bus. 12. Aug. (2, 2i). Eine Infektionsstelle trägt stellenweises Mycel, das nicht über die Infektionsgrenzen hinausgreift; die 2. Infektionsstelle zeigt gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel; Kontrollstellen frei.

14. Aug. Beide Infektionsstellen mit scharf begrenzter, mittelstarker Infektion; Kontrollstellen frei.

16. Aug. Gleiche Beobachtung wie am 14. Aug. Schwache Konidienbildung.

8) *Alchim. grossidens* Bus. 12. und 14. Aug. (3, 3i). Infektionsfrei.

16. Aug. 2 Infektionsblätter zeigen an je einer Infektionsstelle einige Mycelfäden mit einer Gruppe von Konidien. Das 3. Infektionsblatt, wie die Kontrollstellen, sind frei.

19. Aug. Gleiche Beobachtung wie am 16. Aug. Die Infektion wird als „zweifelhaft“ bezeichnet.

12) *Alchim. alpigena* Bus. 14. Aug. (3, 3i). Sämtliche Infektionsstellen frei. Eine Kontrollstelle trägt eine Fremdinfection.

16. und 19. Aug. Gleiche Beobachtung wie am 14. Aug. Es wird Nichtinfektion angenommen.

14) *Alchim. pallens* Bus. 16. Aug. Eine starke Fremdinfection verunmöglicht sichere Kontrolle.

15) *Alchim. glacialis* Bus. 16. Aug. Eine starke Fremdinfection verunmöglicht sichere Kontrolle.

Die folgenden Infektionspflanzen bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes infektionsfrei: *Alchim. multiflora* Bus., *Alchim. alpina* L. vera, *Alch. conjuncta* Bab., *Alch. chirophylla* Bus., *Alch. obovalis* Bus., *Alchim. nitida* Bus.

(Siehe Tabelle p. 24.)

#### Ergebnis der Infektionsreihen 13—17:

1) Das *Oidium* auf *Alchim. pastoralis* Bus. infizierte folgende Species der Vulgares: *Alch. connivens* Bus., *impexa* Bus., *alpestris* Schmidt, *pastoralis* Bus., *crinita* Bus., *micans* Bus. und *coriacea* Bus. Die Species: *Alchim. reniformis* Bus. und *versipila* Bus. weisen Fremdinfectionen auf, die ein entscheidendes Resultat verunmöglichen. Doch deuten diese Fremdinfectionen darauf hin, daß diese beiden Arten für Infektionen eine gewisse Empfänglichkeit besitzen, wobei allerdings unentschieden ist, ob dieselbe allgemeiner Natur ist oder nur für ein bestimmtes *Oidium* besteht. *Alchim. demissa* Bus. und *Alchim. multiflora* Bus. zeichnen sich aus durch Nichtinfektion; dabei ist zu beachten, daß dieses negative Resultat durch die dreimalige Wiederholung bei *Alchim. multiflora* Bus. eine größere Wahrscheinlichkeit besitzt als bei *Alch. demissa* Bus.

2) Die Gruppe der Pubescentes lieferte nur 2 sichere Resultate: die Infektion der *Alch. intermedia* Clairv. und die Nichtinfektion der

Tabelle zu den Versuchsreihen 13—17,  
ausgeführt mit Konidien von *A. pastoralis* stammend.

| Infektionspflanzen  | Reihe:<br>13 | Reihe<br>15 | Reihe<br>16 | Reihe<br>17 | Reihe<br>14 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vulgares: Alch. connivens Bus.  | ?            | +           | +           |             |             |
| " impexa Bus.   | +            | +           | +           |             |             |
| " alpestris Schmidt   | +            |             |             |             |             |
| " reniformis Bus.   | —            | o           | o           |             |             |
| " versipila Bus.  |              |             | o           |             |             |
| " pastoralis Bus.   | +            | +           | +           | +           | +           |
| " crinita Bus.  | +            | +           | +           |             |             |
| " micans Bus.   | +            | ?           | +           | +           |             |
| " coriacea Bus.   | +            | o           | ?           |             |             |
| " demissa Bus.  | —            |             |             |             |             |
| " multiflora Bus.   |              | —           | —           | —           |             |
| Pubescentes: Alch. pubescens Lam.   | o            | o           | o           | ?           |             |
| " flabellata Bus.   | —            | o           |             |             |             |
| " intermedia Clairv.  | +            |             | o           |             |             |
| " sericata Rchbg.   | —            | —           | —           |             |             |
| Calicinae: Alch. glaberrima Schmidt   | o            |             | o           |             |             |
| " incisa Bus.   | ?            |             | o           |             |             |
| " fallax Bus.   | ?            | +           | o           | +           |             |
| " flexicaulis Bus.  |              | +           | +           | +           |             |
| " firma Bus.  |              |             | +           |             |             |
| Splendentes: Alch. Faeroensis Bus.  |              |             | o           |             |             |
| Alpinae: Alch. alpina L. vera   | —            | ?           | —           | —           |             |
| " Hoppeana Rchbg.   | —            | —           | —           |             |             |
| " grossidens Bus.   |              | —           | o           | ?           |             |
| " conjuncta Bab.  |              |             | —           | —           |             |
| " alpigena Bus.   |              |             | —           | —           |             |
| " obovalis Bus.   |              | —           | —           | —           |             |
| " chirophylla Bus.  |              |             | —           | —           |             |
| " glacialis Bus.  |              |             | —           | o           |             |
| " nitida Bus.   | —            | ?           | —           | —           |             |
| " pallens Bus.  |              |             | —           | o           |             |
| Versuchspflanzen der Reihe 14: <i>Erodium moschatum</i> L., <i>Fragaria vesca</i> , <i>Potentilla glandulosa</i> , <i>Rubus odoratus</i> , <i>Viola canina</i> L., <i>Plantago montana</i> und <i>serpentina</i> , <i>Humulus japonicus</i> und <i>Geranium pratense</i> L. |              |             |             |             | —           |

Erklärung der Zeichen: + bedeutet positive, — negative, ? zweifelhafte Infektion; o bedeutet Fremdinfection.

Alch. sericata Rchbg. Bei den 2 anderen Species: Alchim. pubescens Lam. und Alch. flabellata Bus. zeigt sich eine große Neigung zu Fremdinfectionen.

3) Von den Calicinae wurden Alchim. fallax Bus., flexicaulis Bus. und firma Bus. sicher infiziert. Alch. glaberrima Schmidt und incisa Bus. weisen Fremdinfectionen auf; ihre große Empfänglichkeit läßt erwarten, daß sie durch das Oidium auf Alchim. pastoralis auch infiziert werden können.

4) Alch. Faeroensis Bus., zu den Splendentes gehörend, zeigte Fremdinfection.

5) Die Infektionsergebnisse der Alpinae sind äußerst schwierig zu beurteilen. Aus dem Protokoll der Experimente ist ersichtlich, daß die Infektionen der Alchim. alpina L. vera, Alch. grossidens Bus. und Alchim. nitida Bus. durch das Oidium auf Alchim. pasto-

ralis Bus. einen ziemlich Grad von Wahrscheinlichkeit für sich haben; das wechselnde Verhalten, wie gewisse technische Schwierigkeiten, bedingen aber die Bezeichnung des Infektionserfolges als „zweifelhaft“. Ebenso deuten die Fremdinfectionen auf *Alch. glacialis* Bus. und *pallens* Bus. auf eine bestehende Empfänglichkeit für Infectionen hin. Konsequent negativ verhielten sich die Species: *Alch. Hoppeana* Rchbg., *conjuncta* Bab., *alpigena* Bus., *obovalis* Bus. und *chirophylla* Bus.

6) Das Infektionsvermögen des *Oidium*s auf *Alchim. pastoralis* Bus. ist auf die Gattung *Alchimilla* beschränkt, indem andere Rosaceengenera, wie auch andere Wirtsgattungen der *Sphaerotheca Humuli*, immun blieben.

#### IV. *Oidium* von *Alchimilla impexa* Bus. stammend.

(Das Material stammt her von einer infizierten Topfpflanze im Botanischen Garten in Bern.)

Reihe 18: Eingeleitet am 14. Mai 1907.

Infektionspflanzen:

*Alch. impexa* Bus.  
„ *pastoralis* Bus.

Beobachtungen:

1) *Alchim. impexa* Bus. 16. Mai. Eine Infektionsstelle zeigt ziemlich scharf begrenztes, gleichmäßiges Mycel; 2 Kontrollstellen mit kleinen Fremdinfectionen.

17. Mai. Gleiche Beobachtung wie am 16. Mai.

24. Mai. Eine Infektionsstelle läßt die Infektionsgrenzen ziemlich deutlich erkennen, dichtes Mycel, Konidienbildung; verschiedene Kontrollstellen tragen aber starke Fremdinfectionen.

2) *Alchim. pastoralis* Bus. 16. Mai. Infektionsfrei.

24. Mai. Von 3 Infektionsstellen zeigen 2 scharf begrenztes, dichtes Mycel mit Konidienbildung. Die 3. Infektionsstelle weist unscharfe Begrenzung auf. Kontrollstellen frei.

Reihe 19: Eingeleitet am 30. Mai 1907.

Infektionspflanzen:

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Vulgares:                      | Splendentes:                   |
| 1. <i>Alch. impexa</i> Bus.    | 5. <i>Alch. Paicheana</i> Bus. |
| 2. „ <i>pastoralis</i> Bus.    | Alpinae:                       |
| Pubescentes:                   | 6. <i>Alch. alpina</i> L. vera |
| 3. <i>Alch. pubescens</i> Lam. | 7. „ <i>grossidens</i> Bus.    |
| 4. „ <i>flabellata</i> Bus.    | 8. „ <i>glacialis</i> Bus.     |

Beobachtungen:

1) *Alchim. impexa* Bus. 2. Juni. Sämtliche Infektionsflächen zeigen scharf begrenztes, gleichmäßiges Mycel. Kontrollstellen frei.

4. Juni. Gleiche Beobachtung wie am 2. Juni. Starke Konidienbildung.

2) *Alchim. pastoralis* Bus. 2. Juni. Infektionsstellen noch infektionsfrei; eine Kontrollstelle zeigt kleine Fremdinfection.

4. Juni. Die Infektionsstellen sind gleichmäßig und mit scharfer Begrenzung infiziert. Die Fremdinfection auf Kontrollstelle hat sich nicht stärker entwickelt.

5. Juni. Gleiche Beobachtung wie am 4. Juni. Schwache Konidienbildung.

3) *Alchim. pubescens* Lam. 2. und 3. Juni. Infektionsfrei.

4. Juni. Die Infektionsstellen sind vollständig frei; eine Kontrollstelle trägt schwache Fremdinfection.

5. Juni. Gleiche Beobachtung wie am 4. Juni. Es wird Nichtinfektion angenommen.

5) *Alchim. Paicheana* Bus. 1. Juni. Fremdinfectionen verunmöglichen die Kontrolle.

Die folgenden Versuchspflanzen bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes vollständig infektionsfrei: *Alch. flabellata* Bus., *grossidens* Bus., *alpina* L. *vera* und *glacialis* Bus.

**Reihe 20:** Eingeleitet am 19. Aug. 1907.

Infektionspflanzen:

| Vulgares:                        | Alpinae:                              |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. <i>Alch. connivens</i> Bus.   | 8. <i>Alch. alpina</i> L. <i>vera</i> |
| 2. „ <i>pastoralis</i> Bus.      | 9. „ <i>grossidens</i> Bus.           |
| 3. „ <i>micans</i> Bus.          | 10. „ <i>chirophylla</i> Bus.         |
| 4. „ <i>crinita</i> Bus.         | 11. „ <i>conjuncta</i> Bab.           |
| Pubescentes:                     | 12. „ <i>pallens</i> Bus.             |
| 5. <i>Alch. pubescens</i> Lam.   | 13. „ <i>obovalis</i> Bus.            |
| Calicinae:                       | 14. „ <i>glacialis</i> Bus.           |
| 6. <i>Alch. flexicaulis</i> Bus. | 15. „ <i>nitida</i> Bus.              |
| 7. „ <i>fallax</i> Bus.          |                                       |

Beobachtungen: 23. Aug. Sporenkeimung auf Objektträger beobachtet.

1) *Alchim. connivens* Bus. 23. Aug. Infektionsfrei.

26. Aug. Infektionsfrei.

29. Aug. (2, 2i). Im ganzen wurde an 3 Stellen infiziert. Alle 3 Stellen zeigen stellenweises Mycel, das aber die Infektionsgrenzen scharf bezeichnet. Eine Kontrollstelle trägt winzige Fremdinfection.

30. Aug. Gleiche Beobachtung wie am 29. Aug. Schwache Konidienbildung. Es wird positive Infektion angenommen.

2) *Alchim. pastoralis* Bus. 23. und 26. Aug. Infektionsfrei.

29. Aug. (3, 3i). Ein Blatt ist abgestorben. Das 2. Infektionsblatt ist frei. Das 3. Infektionsblatt trägt an der Infektionsstelle scharf begrenztes, gleichmäßiges Mycel; Kontrollstellen frei.

30. Aug. Gleiche Beobachtung wie am 29. Aug. Schwache Konidienbildung. Es wird positive Infektion angenommen.

3) *Alchim. micans* Bus. 23. und 26. Aug. Infektionsfrei.

29. Aug. (2, 2i). Beide Infektionsstellen tragen gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel; ganz schwache Konidienbildung. Kontrollstellen frei.

30. Aug. Starke, scharf begrenzte Infektion, mittelstarke Konidienbildung; Kontrollstellen frei.

4) *Alchim. crinita* Bus. 23. Aug. Infektionsfrei.

26. Aug. (3, 3i). Die Infektionsstellen sind frei; eine Kontrollstelle trägt Fremdinfection.

29. Aug. 2 Blätter sind abgestorben, das 3. Blatt zeigt starke Fremdinfection, die Kontrolle verunmöglicht.

5) *Alchim. pubescens* Lam. 29. Aug. Fremdinfectionen verunmöglichen die Kontrolle.

6) *Alchim. flexicaulis* Bus. 26. Aug. (2, 2i). Die 2 Infektionsblätter



wurden an 4 Stellen infiziert. Davon tragen 3 ganz schwaches, stellenweises, nicht über die Infektionsgrenzen hinausgehendes Mycel. Die 4. Infektionsstelle, wie sämtliche Kontrollstellen, infektionsfrei.

29. Aug. Sämtliche 4 Infektionsstellen tragen gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel; Kontrollstellen frei.

30. Aug. Gleiche Beobachtung wie am 29. Aug. Mittelstarke Konidienbildung.

7) *Alchim. fallax* Bus. 23. und 26. Aug. Infektionsfrei.

29. Aug. (3, 3i). Von 4 Infektionsstellen zeigen 2 stellenweises, aber scharf begrenztes Mycel und eine gleichmäßiges, ebenfalls scharf begrenztes Mycel. Die 4. Infektionsstelle wie sämtliche Kontrollstellen frei.

30. Aug. Gleiche Beobachtung wie am 29. Aug. Es wird positive Infektion angenommen.

14) *Alchim. glacialis* Bus. 29. Aug. Fremdinfectionen verunmöglichen die Kontrolle.

Die folgenden Infektionspflanzen bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes vollständig infektionsfrei: *Alchim. alpina* L. vera, *grossidens* Bus., *chirophylla* Bus., *conjuncta* Bab., *pallens* Bus., *obovalis* Bus. und *nitida* Bus.

Tabelle zu den Versuchsreihen 18—20,  
ausgeführt mit Konidien von *A. impexa* stammend.

| Infektionspflanzen                       | Reihe<br>18 | Reihe<br>19 | Reihe<br>20 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Vulgares: <i>Alch. connivens</i> Bus.    |             |             | +           |
| „ <i>impexa</i> Bus.                     | +           | +           |             |
| „ <i>pastoralis</i> Bus.                 | +           | +           | +           |
| „ <i>crinita</i> Bus.                    |             |             | o           |
| „ <i>micans</i> Bus.                     |             |             | +           |
| Pubescentes: <i>Alch. pubescens</i> Lam. |             | —           | o           |
| „ <i>flabellata</i> Bus.                 |             | —           |             |
| Calicinae: <i>Alch. flexicaulis</i> Bus. |             |             | +           |
| „ <i>fallax</i> Bus.                     |             |             | +           |
| Splendentes: <i>Alch. Paicheana</i> Bus. |             | o           |             |
| Alpinae: <i>Alch. alpina</i> L. vera     |             | —           | —           |
| „ <i>grossidens</i> Bus.                 |             | —           | —           |
| „ <i>conjuncta</i> Bab.                  |             |             | —           |
| „ <i>obovalis</i> Bus.                   |             |             | —           |
| „ <i>chirophylla</i> Bus.                |             |             | —           |
| „ <i>glacialis</i> Bus.                  |             | —           | o           |
| „ <i>nitida</i> Bus.                     |             |             | —           |
| „ <i>pallens</i> Bus.                    |             |             | —           |

Erklärung der Zeichen: + bedeutet positive, — negative Infektion; o bedeutet Fremdinfection.

#### Ergebnis der Infektionsreihen 18—20.

1) Die folgenden *Vulgares*-Species wurden durch das *Oidium* auf *Alchim. impexa* Bus. infiziert: *Alchim. connivens* Bus., *impexa* Bus., *pastoralis* Bus. und *micans* Bus. *Alchim. crinita* Bus. verunmöglichte die Kontrolle durch Fremdinfection. Doch ist es sehr wahrscheinlich, daß auch diese Species durch das vorliegende *Oidium* infiziert werden kann, da *Alch. crinita* Bus. sich in den vorhergehenden und nachfolgenden Experimenten stets gleich verhielt, wie ihre nahe Verwandte *Alchim. pastoralis* Bus. In den gegenwärtigen Versuchen wurde aber diese letztere dreimal kräftig infiziert.

2) Die Pubescentes: *Alchim. pubescens* Lam. und *Alch. flabellata* Bus. blieben immun; doch ist auch hier die Unzulänglichkeit der negativen Resultate um so mehr zu beachten, als diese Immunität nur durch ein einziges Experiment festgestellt wurde.

3) Die Calicinae: *Alchim. flexicaulis* Bus. und *Alchim. fallax* zeigten sich für das *Oidium* auf *Alchim. impexa* Bus. leicht empfänglich.

4) *Alch. Paicheana* Bus., zu den Splendentes gehörend, vermittelte die Kontrolle durch Fremdinfection.

5) Sämtliche Alpinae blieben immun. Dieses Resultat ist bemerkenswert, da aus nachfolgenden Versuchen hervorgeht, daß *Alchim. impexa* Bus. für *Oidien* auf Alpinae-Species empfänglich ist.

### V. *Oidium* von *Alchimilla flexicaulis* Bus. stammend.

(Das Material stammt her von infizierten Topfpflanzen im Botanischen Garten in Bern.)

Reihe 21: Eingeleitet am 20. Juni 1907.

Infektionspflanzen:

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Vulgares:                       |                                     |
| 1. <i>Alch. connivens</i> Bus.  | 14. <i>Alch. intermedia</i> Clairv. |
| 2. " <i>impexa</i> Bus.         | 15. " <i>Lapeyrousei</i> Bus.       |
| 3. " <i>alpestris</i> Schmidt   | Calicinae:                          |
| 4. " <i>reniformis</i> Bus.     | 16. <i>Alch. incisa</i> Bus.        |
| 5. " <i>versipila</i> Bus.      | 17. " <i>flexicaulis</i> Bus.       |
| 6. " <i>pastoralis</i> Bus.     | 18. " <i>fallax</i> Bus.            |
| 7. " <i>crinita</i> Bus.        | 19. " <i>firma</i> Bus.             |
| 8. " <i>micans</i> Bus.         | Splendentes:                        |
| 9. " <i>heteropoda</i> Bus.     | 20. <i>Alchim. Paicheana</i> Bus.   |
| 10. " <i>coriacea</i> Bus.      | Alpinae:                            |
| 11. " <i>multiflora</i> Bus.    | 21. <i>Alch. alpina</i> L. vera     |
| Pubescentes:                    | 22. " <i>alpigena</i> Bus.          |
| 12. <i>Alch. pubescens</i> Lam. | 23. " <i>glacialis</i> Bus.         |
| 13. " <i>flabellata</i> Bus.    |                                     |

Beobachtungen: 22. Juni. Sporenkeimung auf Objektträger beobachtet.

1) *Alchim. connivens* Bus. 24. Juni. Sämtliche Infektionsstellen sind gleichmäßig und scharf begrenzt infiziert. Verschiedene Kontrollstellen tragen winzige, vorgeschrittene (Konidienbildung!) Fremdinfectionen.

26. Juni. Gleiche Beobachtung wie am 24. Juni.

28. Juni. Jede Infektionsstelle trägt gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel mit Konidien. Die Fremdinfectionen haben sich nicht stärker entwickelt. Es wird positive Infektion angenommen.

2) *Alchim. impexa* Bus. 24. Juni. Die Infektionsstellen sind gleichmäßig und mit scharfer Begrenzung infiziert; Kontrollstellen frei.

28. Juni. Starke und scharf begrenzte Infektion, kräftige Konidienbildung. Kontrollstellen frei.

3) *Alchim. alpestris* Schmidt. 24. Juni. Sämtliche Infektionsstellen mit dichtem, gleichmäßigem Mycel; scharfe Begrenzung. Kontrollstellen frei.

28. Juni. Starke und scharf begrenzte Infektion, Konidienbildung. Kontrollstellen frei.

4) *Alchim. reniformis* Bus. 24. Juni. Die Infektionsstellen tragen schwaches, aber gleichmäßiges Mycel, das die Infektionsgrenzen ziemlich scharf zeichnet. 2 Kontrollstellen tragen leichte Fremdinfectionen.

26. Juni. Gleiche Beobachtung wie am 24. Juni; 4 Kontrollstellen tragen leichte Fremdinfectionen.

28. Juni. Die Infektionsstellen tragen teilweise dichtes, teilweise schwaches Mycel; die Infektionsgrenzen sind ziemlich scharf gezeichnet. Dagegen haben sich die Fremdinfectionen stark ausgedehnt. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

5) *Alchim. versipila* Bus. 24. Juni. Fremdinfectionen verunmöglichen die Kontrolle.

6) *Alchim. pastoralis* Bus. 26. Juni. Die Infektionsstellen sind gleichmäßig und mit scharfer Begrenzung infiziert. Kontrollstellen frei.

28. Juni. Starke, gleichmäßige, scharf begrenzte Infektion, Konidienbildung; Kontrollstellen frei.

7) *Alchim. crinita* Bus. 26. Juni. Schwaches aber gleichmäßiges Mycel auf den Infektionsstellen; scharfe Begrenzung; Kontrollstellen frei.

28. Juni. Dichtes Mycel, scharfe Begrenzung, Konidienbildung; Kontrollstellen frei.

8) *Alchim. micans* Bus. 26. Juni. Die Infektionsstellen sind gleichmäßig und mit scharfer Begrenzung infiziert. Ein nicht infiziertes Blatt (Kontrollblatt) trägt winzige Fremdinfection; die übrigen Kontrollstellen frei.

28. Juni. Gleiche Beobachtung wie am 26. Juni. Konidienbildung. Es wird positive Infektion angenommen.

9) *Alchim. heteropoda* Bus. 24. Juni. Sämtliche Blätter haben unter Fäulnis gelitten, so daß sie entfernt werden müssen.

10) *Alchim. coriacea* Bus. 26. Juni. Die Infektionsstellen tragen gleichmäßiges Mycel; die Infektionsgrenzen sind aber unscharf gezeichnet. 2 Kontrollstellen tragen kleine Fremdinfectionen.

28. Juni. Wie am 26. Juni. Die Fremdinfectionen haben sich vermehrt. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

12) *Alchim. pubescens* Lam. 26. Juni. Die Infektionsstellen sind frei; verschiedene Kontrollstellen tragen kleine Fremdinfectionen.

28. Juni. Die Infektionsstellen sind frei; die Fremdinfectionen (2) sind äußerst klein. Es wird Nichtinfektion angenommen.

14) *Alchim. intermedia* Clairv. 26. Juni. (6, 3i). Eine Infektionsstelle trägt gleichmäßiges und scharf begrenztes Mycel; doch zeigt dieses Blatt an einer Kontrollstelle Fremdinfection. Die 2. Infektionsstelle ist unscharf infiziert; die Kontrollstellen sind frei. Die 3. Infektionsstelle ist frei, ebenso sind sämtliche übrigen Kontrollstellen infektionsfrei.

28. Juni. Wie am 26. Juni. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

15) *Alchim. Lapeyrousei* Bus. 26. Juni. Fremdinfectionen verunmöglichen die Kontrolle.

16) *Alchim. incisa* Bus. 26. Juni. Fremdinfectionen verunmöglichen die Kontrolle.

17) *Alchim. flexicaulis* Bus. 24. Juni. Sämtliche Infektionsstellen sind schwach, aber gleichmäßig und mit scharfer Begrenzung infiziert. Kontrollstellen frei.

26. Juni. Stärkere Infektion, scharfe Infektionsgrenzen. Eine Kontrollstelle trägt winzige Fremdinfection.

18) *Alchim. fallax* Bus. 24. Juni. (5, 3i). 2 Infektionsblätter sind abgestorben. Das 3. Blatt hat 2 Infektionsstellen; von diesen ist die eine gleichmäßig und scharf begrenzt infiziert, während die andere

infektionsfrei ist. Ein nicht infiziertes Blatt (Kontrollblatt) zeigt sehr starke Fremdinfection; die übrigen Kontrollstellen frei.

28. Juni. Gleiche Beobachtung wie am 26. Juni. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

19) Alchim. firma Bus. 26. Juni. Fremdinfectionen verunmöglichen die Kontrolle.

20) Alchim. Paicheana Bus. 26. Juni. Fremdinfectionen verunmöglichen die Kontrolle.

21) Alchim. alpina L. vera. 24. Juni. (4, 2i). Ein infizierter Blattlappen zeigt eine kleine Gruppe von Konidienträgern (ca. 6). Die anderen Infektionsstellen wie sämtliche Kontrollstellen sind frei.

26. Juni. Ein Infektionsblatt ist vollständig infektionsfrei. Das andere zeigt an 2 von 3 infizierten Blattlappen gleichmäßiges Mycel mit Konidien. Doch weist ein nicht infizierter Blattlappen eine Fremdinfection auf, bestehend aus ein paar Konidienträgern ohne erkennbares Mycel.

28. Juni. 3 Infektionsstellen zeigen nunmehr Mycel mit Konidienbildung; allein ein nicht infiziertes Blatt trägt an 2 Blattlappen ebenfalls Konidien. Es muß „Fremdinfection“ angenommen werden.

22) Alchim. alpigena Bus. 24. Juni. Die Infektionsstellen sind frei. Eine Kontrollstelle zeigt sehr kleine Fremdinfection.

26. Juni. Wie am 24. Juni.

28. Juni. (5, 2i). Ein Infektionsblatt hat an sämtlichen 3 infizierten Blattlappen gleichmäßiges Mycel mit Konidien. Die Kontrollstellen dieses Blattes sind frei; doch zeigt das 2. Infektionsblatt an 2 Kontrollstellen Fremdinfection. Die Infektionsstellen dieses Blattes, wie die übrigen Kontrollstellen sind infektionsfrei. Es muß „Fremdinfection“ angenommen werden.

Die folgenden Infektionspflanzen bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes infektionsfrei: Alchim. multiflora Bus., Alchim. flabellata Bus., Alchimilla glacialis Bus.

Reihe 22: Eingeleitet am 1. Juli 1907.

Infektionspflanzen:

| Vulgares:                  |  | 11. Alch. fallax Bus.    |
|----------------------------|--|--------------------------|
| 1. Alch. connivens Bus.    |  | 12. „ firma Bus.         |
| 2. „ impexa Bus.           |  | Alpinae:                 |
| 3. „ alpestris Schmidt     |  | 13. Alch. alpina L. vera |
| 4. „ pastoralis Bus.       |  | 14. „ Hoppeana Rchbg.    |
| 5. „ crinita Bus.          |  | 15. „ chirophylla Bus.   |
| 6. „ micans Bus.           |  | 16. „ conjuncta Bab.     |
| 7. „ coriacea Bus.         |  | 17. „ alpigena Bus.      |
| Pubescentes:               |  | 18. „ obovalis Bus.      |
| 8. Alch. pubescens Lam.    |  | 19. „ glacialis Bus.     |
| 9. „ intermedia Clairv.    |  | 20. „ nitida Bus.        |
| Calicinae:                 |  | Bastarde:                |
| 10. Alch. flexicaulis Bus. |  | 21. Alch. gemma Bus.     |

Beobachtungen: 3. Juli. Sporenkeimung auf Objektträger beobachtet.

1) Alchim. connivens Bus. 6. Juli. (2, 2i). Beide Infektionsstellen tragen stellenweises Mycel, das aber die Infektionsgrenzen scharf zeichnet. Kontrollstellen frei.

8. Juli. Beide Infektionsstellen sind gleichmäßig und scharf begrenzt infiziert. Eine Kontrollstelle trägt winzige Fremdinfection. Es wird positive Infektion angenommen.

2) *Alchim. impexa* Bus. 5. Juli. (3, 3i). Sämtliche Infektionsstellen tragen gleichmäßiges, schwaches, scharf begrenztes Mycel, Kontrollstellen frei.

10. Juli. Starke, scharf begrenzte Infektion, kräftige Konidienbildung; Kontrollstellen infektiösfrei.

3) *Alchim. alpestris* Schmidt. 6. Juli. (2, 2i). Ein Blatt ist abgestorben. Das gesunde Infektionsblatt zeigt an der Infektionsstelle gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel. Kontrollstellen frei.

8. Juli. Wie am 6. Juli.

10. Juli. Starke, scharf begrenzte Infektion, kräftige Konidienbildung; Kontrollstellen frei. Es wird positive Infektion angenommen.

4) *Alchim. pastoralis* Bus. 6. Juli. Infektiösfrei.

8. Juli. (4, 3i). Sämtliche 3 Infektionsstellen sind stellenweise aber mit scharfen Grenzen infiziert. Kontrollstellen frei.

10. Juli. Die Infektion hat sich nicht stärker entwickelt. Kontrollstellen frei. Es wird positive Infektion angenommen.

5) *Alchim. crinita* Bus. 6. Juli. Infektiösfrei.

8. Juli. (4, 3i). Eine Infektionsstelle ist gleichmäßig und scharf begrenzt infiziert; die 2 anderen Infektionsstellen tragen stellenweises Mycel, das nicht über die Infektionsgrenzen hinausgreift. Kontrollstellen frei.

10. Juli. Wie am 8. Juli. Die Infektion hat sich nicht stärker entwickelt. Es wird positive Infektion angenommen.

6) *Alchim. micans* Bus. 8. Juli. (2, 2i). Beide Infektionsstellen sind gleichmäßig und mit scharfer Begrenzung infiziert; eine Kontrollstelle trägt kleine Fremdinfektion.

10. Juli. Wie am 8. Juli. Es wird positive Infektion angenommen.

7) *Alchim. coriacea* Bus. 6. Juli. Fremdinfektionen verunmöglichen die Kontrolle.

8) *Alchim. pubescens* Lam. 5. und 6. Juli. (3, 2i). Infektiösfrei.

8. Juli. Infektiösfrei, doch leiden die Blätter unter Fäulnis, so daß sie entfernt werden müssen.

9) *Alchim. intermedia* Clairv. 6. Juli. (5, 3i). 2 Infektionsstellen tragen leichtes, stellenweises Mycel, das nicht über die Infektionsgrenzen hinausgreift. Eine Infektionsstelle ist frei, ebenso sind sämtliche Kontrollstellen infektiösfrei.

8. Juli. Alle 3 Infektionsstellen tragen stellenweises Mycel; die Grenzen sind teilweise scharf gezeichnet. Kontrollstellen frei. Die Blätter leiden an Fäulnis und müssen ausgeschaltet werden. Es wird positive Infektion angenommen.

10) *Alchim. flexicaulis* Bus. 6. Juli. (3, 3i). Die 3 Infektionsstellen sind stellenweise infiziert, das Mycel greift nirgends über die Infektionsgrenzen hinaus. Kontrollstellen frei.

8. Juli. 2 Infektionsstellen sind gleichmäßig und mit ziemlich scharfer Begrenzung infiziert; eine Infektionsstelle trägt nur stellenweise Mycel. Eine Kontrollstelle mit kleiner Fremdinfektion.

10. Juli. Sämtliche Infektionsstellen zeigen gleichmäßiges, ziemlich scharf begrenztes Mycel, Konidienbildung; Kontrollstellen mit einer Ausnahme frei. Es wird positive Infektion angenommen.

11) *Alchim. fallax* Bus. 6. Juli. (4, 3i). 2 Infektionsflächen zeigen stellenweise Mycel, die 3. Infektionsstelle ist frei. Kontrollstellen frei.

8. Juli. 2 Infektionsstellen sind gleichmäßig und scharf begrenzt infiziert; die 3. Infektionsstelle ist frei (altes Blatt). Kontrollstellen frei.

10. Juli. Wie am 8. Juli. Es wird positive Infektion angenommen.  
12) *Alchim. firma* Bus. 8. Juli. Fremdinfektionen verunmöglichen die Kontrolle.

13) *Alchim. alpina* L. vera. 6. und 8. Juli. Infektionsfrei.

10. Juli. (2, 2i). Die 2 Infektionsblätter zeigen an je einem infizierten Blattlappen ganz schwache Infektion, bestehend in einer kleinen Gruppe von Konidienträgern und schwachem Mycel. Die Kontrollstellen sind frei.

12. Juli. Ein Infektionsblatt ist abgestorben, das andere trägt an der Infektionsstelle ganz schwaches Mycel mit einigen Konidienträgern. Die Infektion ist, auch in Rücksicht der Infektion in Reihe 21, sehr wahrscheinlich. Da es sich hier aber um eine der wichtigsten Fragen, um die Möglichkeit einer Infektion der *Alpinae* durch eine andere Gruppe handelt, so ist eine noch überzeugendere Beweisführung notwendig. Infolgedessen kann die Infektion nur als „zweifelhaft“ bezeichnet werden.

17) *Alchim. alpigena* Bus. 6. und 8. Juli. Infektionsfrei.

10. Juli. (4, 4i). Ein Infektionsblatt trägt an 2 infizierten Blattlappen eine leichte Infektion, bestehend in schwachem Mycel und einigen Konidienträgern. Kontrollstellen, wie die anderen 3 Infektionsstellen, sind frei.

12. Juli. Gleiche Beobachtung wie am 10. Juli. Die Infektion wird als „zweifelhaft“ bezeichnet.

19) *Alchim. glacialis* Bus. 6. Juli (4, 3i). Infektionsfrei.

8. Juli. Ein Infektionsblatt trägt an 2 infizierten Blattlappen schwaches Mycel; ein 3. infizierter Blattlappen dieses Blattes ist frei; ebenso sind sämtliche übrigen Infektionsstellen, wie sämtliche Kontrollstellen, infektionsfrei.

10. Juli. Wie am 8. Juli. Ganz schwache Konidienbildung. Die Infektion wird als „zweifelhaft“ bezeichnet.

20) *Alchim. nitida* Bus. 6. Juli. Infektionsfrei.

8. Juli. (4, 3i). Ein Infektionsblatt zeigt an 2 von 3 infizierten Blattlappen schwaches Mycel mit einigen Konidienträgern. Die übrigen Infektionsstellen, wie sämtliche Kontrollstellen, sind frei.

10. Juli. Das Infektionsblatt, das am 8. Juli Infektion zeigte, besitzt 7 Blattlappen; davon wurden 3 infiziert. Diese 3 Blattlappen tragen schwaches Mycel mit einigen Konidienträgern. Die 4 nicht infizierten Blattlappen dieses Blattes sind frei, ebenso sind die übrigen Infektions- und Kontrollstellen infektionsfrei.

12. Juli. Von den 3 infizierten Infektionsblättern tragen nunmehr 2 Infektionen, und zwar das eine Blatt an sämtlichen infizierten Stellen, das andere an einer Stelle (von 3 Infektionsstellen). Das 3. Infektionsblatt ist abgestorben. Sämtliche Kontrollstellen sind frei. Das bei *Alchim. alpina* Bus. L. vera Gesagte gilt auch hier. Die Infektion wird demgemäß als „zweifelhaft“ bezeichnet.

Die folgenden Infektionspflanzen bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes infektionsfrei: *Alchim. Hoppeana* Rehb., *Alch. chirophylla* Bus., *Alch. conjuncta* Bab., *Alch. obovalis* Bus., *Alch. gemmia* Bus.

(Siehe Tabelle p. 33.)

Ergebnis der Infektionsreihen 21 und 22.

1) Die *Vulgares*-Species: *Alch. connivens* Bus., *impexa* Bus., *alpestris* Schmidt, *pastoralis* Bus., *crinita* Bus. und *micans* Bus. wurden durch das *Oidium* auf *Alchim. flexicaulis* Bus.

Tabelle zu den Versuchsreihen 21 und 22,  
ausgeführt mit Konidien von *A. flexicaulis* stammend.

| Infektionspflanzen   | Reihe<br>21 | Reihe<br>22 |
|--|-------------|-------------|
| Vulgares: Alch. <i>connivens</i> Bus.  | +           | +           |
| „ <i>impexa</i> Bus.   | +           | +           |
| „ <i>alpestris</i> Schmidt   | +           | +           |
| „ <i>reniformis</i> Bus.   | ?           |             |
| „ <i>versipila</i> Bus.  | o           |             |
| „ <i>pastoralis</i> Bus.   | +           | +           |
| „ <i>crinita</i> Bus.  | +           | +           |
| „ <i>micans</i> Bus.   | +           | +           |
| „ <i>coriacea</i> Bus.   | ?           | o           |
| „ <i>multiflora</i> Bus.   | —           |             |
| Pubescentes: Alch. <i>pubescens</i> Lam.                                       | —           | —           |
| „ <i>flabellata</i> Bus.   | —           |             |
| „ <i>intermedia</i> Clairv.  | ?           | +           |
| „ <i>Lapeyrousei</i> Bus.  | o           |             |
| Calicinae: Alch. <i>incisa</i> Bus.  | o           |             |
| „ <i>fallax</i> Bus.   | ?           | +           |
| „ <i>flexicaulis</i> Bus.  | +           | +           |
| „ <i>firma</i> Bus.  | o           | o           |
| Splendentes: Alch. <i>Paicheana</i> Bus.                                       | o           |             |
| Alpinae: Alch. <i>alpina</i> L. vera   | o           | ?           |
| „ <i>Hoppeana</i> Rehb.  |             | —           |
| „ <i>chirophylla</i> Bus.  |             | —           |
| „ <i>conjuncta</i> Bab.  |             | —           |
| „ <i>alpigena</i> Bus.   | o           | ?           |
| „ <i>obovalis</i> Bus.   |             | —           |
| „ <i>glacialis</i> Bus.  | —           | ?           |
| „ <i>nitida</i> Bus.   |             | ?           |
| Bastarde: Alch. <i>gemma</i> Bus.<br>( <i>pentaphylla</i> × <i>glacialis</i> ) |             | —           |

Anmerkung: + bedeutet positive Infektion, — Nichtinfektion, o Fremdinfection  
? zweifelhafte Infektion.

(Calicinae) infiziert. Alchim. *reniformis* Bus. und *coriacea* Bus. lieferten zweifelhafte Infektionsergebnisse. Alchim. *versipila* Bus. hatte Fremdinfection, während Alchim. *multiflora* Bus., wie immer, immun blieb.

2) Die Pubescentes: Alchim. *pubescens* Lam. und Alch. *flabellata* Bus. blieben in diesen Experimenten infektionsfrei. Alchim. *intermedia* Clairv. zeigte sich auch hier wieder als die empfänglichste ihrer Gruppe, indem sie infiziert wurde. Alchim. *Lapeyrousei* hatte Fremdinfection.

3) Von den Calicinae vereitelten Alchim. *incisa* Bus. und Alchim. *firma* Bus. die Prüfung ihrer Empfänglichkeit durch Fremdinfectionen. Doch ist es sehr wahrscheinlich, daß sie gegen das Oidium ihrer nahen Verwandten Alchim. *flexicaulis* Bus. keine Immunität besitzen, da die Calicinae insgesamt eine sehr große Empfänglichkeit zeigen. Alchim. *fallax* Bus. lieferte ein sicheres, positives Infektionsresultat.

4) Alchim. *splendens* Bus. hatte Fremdinfection.

5) Bei den Alpinae traten die in der Einleitung erwähnten Infektionsschwierigkeiten besonders hervor, so daß die sehr wahrscheinlichen Infektionen von Alchim. *alpina* L. vera, Alchim. *alpigena* Bus., Alchim. *glacialis* Bus. und Alchim. *nitida* Bus. nur als

„zweifelhaft“ hingestellt werden konnten. Immun verhielten sich die Species: *Alchim. Hoppeana* Rchbg., *chirophylla* Bus., *conjuncta* Bab. und *obovalis* Bus.; ebenso blieb der Bastard: *Alch. gemma* Bus. infektionsfrei.

## VI. *Oidium* von *Alchimilla fallax* Bus. stammend.

(Das Material stammt her von einer infizierten Topfpflanze im Botan. Garten in Bern.)

Reihe 23: Eingeleitet am 11. Juli 1907.

Infektionspflanzen:

| Vulgares:                          |  | Calicinae:                       |  |
|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 1. <i>Alch. connivens</i> Bus.     |  | 8. <i>Alch. fallax</i> Bus.      |  |
| 2. „ <i>impexa</i> Bus.            |  | 9. „ <i>flexicaulis</i> Bus.     |  |
| 3. „ <i>alpestris</i> Schmidt      |  | Alpinae:                         |  |
| 4. „ <i>pastoralis</i> Bus.        |  | 10. <i>Alch. Hoppeana</i> Rchbg. |  |
| 5. „ <i>crinita</i> Bus.           |  | 11. „ <i>conjuncta</i> Bab.      |  |
| Pubescentes:                       |  | 12. „ <i>glacialis</i> Bus.      |  |
| 6. <i>Alch. intermedia</i> Clairv. |  | 13. „ <i>nitida</i> Bus.         |  |
| 7. „ <i>sericata</i> Rchbg.        |  |                                  |  |

Beobachtungen:

15. Juli. Sporenkeimung auf Objektträger beobachtet.

1) *Alchim. connivens* Bus. 17. Juli. (1, 1i). Die Infektionsstelle trägt einige kaum bemerkbare Mycelfäden. Kontrollstellen frei.

20. Juli. Die Infektionsstelle trägt gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel; Konidienbildung. Kontrollstellen frei.

2) *Alch. impexa* Bus. 17. Juli. (4, 3i). Alle Infektionsstellen tragen gleichmäßiges, dichtes Mycel; scharfe Infektionsgrenzen. Kontrollstellen frei.

20. Juli. Wie am 17. Juli. Starke Konidienbildung.

3) *Alchim. alpestris* Schmidt. 17. Juli. (5, 3i). Sämtliche Infektionsstellen sind mit scharfer Begrenzung und gleichmäßig infiziert; Konidienbildung. Kontrollstellen frei.

20. Juli. Wie am 17. Juli. Starke Konidienbildung.

4) *Alchim. pastoralis* Bus. 17. Juli. (3, 3i). 2 Infektionsstellen tragen gleichmäßiges, scharf begrenztes, schwaches Mycel. Kontrollstellen, wie die dritte Infektionsstelle, frei.

20. Juli. Wie am 17. Juli. Schwache Konidienbildung.

5) *Alchim. crinita* Bus. 17. Juli. (5, 3i). Die Infektionsstellen zeigen stellenweise Mycel, das nicht über die Infektionsgrenzen hinausgreift. Kontrollstellen frei.

20. Juli. Die Infektionsstellen zeigen ziemlich scharfe Infektionsgrenzen, obschon sich das Mycel nur stellenweise entwickelt hat. An den infizierten Stellen findet starke Konidienbildung statt. Kontrollstellen frei. Es wird positive Infektion angenommen.

6) *Alchim. intermedia* Clairv. 17. Juli. (4, 3i). 2 Infektionsblätter sind abgestorben. Das 3. trägt an der Infektionsstelle einige Mycelfäden. Kontrollstellen frei.

20. Juli. Die Infektionsstelle trägt starkes Mycel mit Konidienbildung; die Infektionsgrenzen sind ziemlich scharf. Kontrollstellen frei. Es wird positive Infektion angenommen.

8) *Alchim. fallax* Bus. 17. Juli. (4, 4i). 2 Infektionsblätter sind abgestorben. Die 2 anderen tragen an den Infektionsstellen stellenweise Mycel mit schwacher Konidienbildung. Eine Kontrollstelle trägt schwache Fremdinfection.



20. Juli. Die Infektionsstellen zeigen ziemlich scharfe Infektionsgrenzen; Konidienbildung. Die Fremdinfection hat sich nicht stärker entwickelt. Es wird positive Infektion angenommen.

9) *Alchim. flexicaulis* Bus. 17. Juli. (2, 2i). Beide Infektionsstellen sind stellenweise, aber scharf begrenzt infiziert. Schwache Konidienbildung. Kontrollstellen frei.

20. Juli. Wie am 17. Juli. Starke Konidienbildung. Es wird positive Infektion angenommen.

12) *Alchim. glacialis* Bus. 17. Juli. (6, 5i). 2 Infektionsblätter zeigen an je einer Infektionsstelle äußerst schwaches Mycel mit einigen Konidienträgern. Die übrigen 3 Infektionsstellen, wie die Kontrollstellen, sind frei.

20. Juli. Wie am 17. Juli. Konidienbildung stärker.

22. Juli. Das Mycel hat sich nicht stärker ausgebreitet; doch produziert es kräftig Konidien. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

13) *Alchim. nitida* Bus. 17. Juli. (3, 3i) infektionsfrei.

20. Juli. 2 Infektionsblätter sind abgestorben. Das dritte zeigt an einem von 3 infizierten Blattlappen starke Konidienbildung. Wegen der Behaarung ist das Mycel nicht zu erkennen. Kontrollstellen frei.

22. Juli. Starke Konidienbildung auf dem infizierten Blattlappen, sonst gleich 20. Juli. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

Die folgenden Infektionspflanzen bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes infektionsfrei: *Alchim. sericata* Rchbg., *Alchim. Hoppeana* Rchbg. und *Alch. conjuncta* Bab.

Ergebnis der Infektionsreihe 23. Das *Oidium* auf *Alchim. fallax* Bus. verhielt sich in seiner Infektionskraft genau gleich wie das *Oidium* auf *Alchim. flexicaulis* Bus. Es geht dies hervor aus: 1) der Infektion der *Vulgares*-Species: *Alchim. connivens* Bus., *impexa* Bus., *alpestris* Schmidt, *pastoralis* Bus. und *crinita* Bus.; 2) der Infektion der *Pubescentes*-Species: *Alchim. intermedia* Clairv.; 3) der Infektion der *Calicinae*-Species: *Alchim. fallax* Bus. und *flexicaulis* Bus. und 4) der „zweifelhafte“ Infektion der *Alpinae*-Arten: *Alchim. glacialis* Bus. und *nitida* Bus. und der Nichtinfektion von *Alchim. Hoppeana* Rchbg. und *conjuncta* Bab. Die nicht infizierte *Pubescentes*-Species: *Alchim. sericata* Rchbg. wurde im Experiment mit dem *Oidium* auf *Alchim. flexicaulis* nicht verwendet, so daß hier kein Vergleich gezogen werden kann.

## VII. *Oidium* von *Alchimilla pubescens* Lam. stammend.

(Das Material der Reihen 24 und 25 stammt her von infizierten Topfpflanzen im Botan. Garten in Bern; das Material der Reihe 26 wurde in Davos-Sertigtal im Freien gesammelt.)

Reihe 24: Eingeleitet am 24. Juni 1907.

Infektionspflanzen:

| Vulgares:                      |  | Pubescentes:                     |  |
|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 1. <i>Alch. connivens</i> Bus. |  | 10. <i>Alch. pubescens</i> Lam.  |  |
| 2. „ <i>impexa</i> Bus.        |  | 11. „ <i>flabellata</i> Bus.     |  |
| 3. „ <i>alpestris</i> Schmidt  |  | 12. „ <i>Lapeyrousei</i> Bus.    |  |
| 4. „ <i>reniformis</i> Bus.    |  | 13. „ <i>intermedia</i> Clairv.  |  |
| 5. „ <i>pastoralis</i> Bus.    |  | 14. „ <i>sericata</i> Rchbg.     |  |
| 6. „ <i>crinita</i> Bus.       |  | Splendentes:                     |  |
| 7. „ <i>micans</i> Bus.        |  | 15. <i>Alch. Faeroensis</i> Bus. |  |
| Calicinae:                     |  | Alpinae:                         |  |
| 8. <i>Alch. fallax</i> Bus.    |  | 16. <i>Alch. alpina</i> L. vera  |  |
| 9. „ <i>flexicaulis</i> Bus.   |  | 17. „ <i>Hoppeana</i> Rchbg.     |  |

**Beobachtungen:**

1) *Alchim. connivens* Bus. 29. Juni. (2, 2i). Beide Infektionsstellen zeigen stellenweise Mycel; die Infektionsgrenzen sind undeutlich. Verschiedene Kontrollstellen tragen schwache Fremdinfektionen.

1. Juli. Die Infektionsstellen tragen gleichmäßiges, ziemlich scharf begrenztes Mycel; allein verschiedene Kontrollstellen zeigen Fremdinfektionen. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

2) *Alchim. impexa* Bus. 29. Juni. (3, 2i). Sämtliche Infektionsstellen sind gleichmäßig und mit scharfer Begrenzung infiziert. Kontrollstellen frei.

1. Juli. Wie am 29. Juni. Starke Konidienbildung.

3) *Alchim. alpestris* Schmidt. 29. Juni. (4, 3i). Die Infektionsstellen zeigen gleichmäßiges Mycel, die Infektionsgrenzen sind scharf gezeichnet; eine Kontrollstelle trägt schwache Fremdinfektion.

4) *Alchim. reniformis* Bus. 29. Juni. (2, 2i) infektionsfrei an den Infektionsstellen; eine Kontrollstelle mit kleiner Fremdinfektion.

1. Juli. Wie am 29. Juni. Es wird Nichtinfektion angenommen.

5) *Alchim. pastoralis* Bus. 29. Juni. (4, 2i). 2 Infektionsstellen sind gleichmäßig und scharf begrenzt infiziert; die 2 anderen Infektionsstellen, wie die Kontrollstellen, sind frei.

1. Juli. Sämtliche Infektionsstellen tragen gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel; Konidienbildung. Kontrollstellen frei.

6) *Alchim. crinita* Bus. 29. Juni. (4, 2i). Beide Infektionsstellen sind gleichmäßig und scharf begrenzt infiziert. Kontrollstellen frei.

1. Juli. Wie am 29. Juni. Starke Konidienbildung.

8) *Alchim. fallax* Bus. 29. Juni. Fremdinfektionen verunmöglichen die Kontrolle.

9) *Alchim. flexicaulis* Bus. 29. Juni. (5, 2i). Eine Infektionsstelle trägt stellenweise schwaches Mycel. Die andere Infektionsstelle ist frei. Eine Kontrollstelle trägt kleine Fremdinfektion.

1. Juli. Eine Infektionsstelle ist gleichmäßig und ziemlich scharf begrenzt infiziert, Konidienbildung. Eine Kontrollstelle dieses Blattes trägt Fremdinfektion. Die anderen Blätter sind abgestorben. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

10) *Alchim. pubescens* Lam. 29. Juni. (4, 2i). Eine Infektionsstelle zeigt gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel. Die andere Infektionsstelle, wie die Kontrollstellen, frei.

1. Juli. Gleiche Beobachtung wie am 29. Juni. Schwache Konidienbildung. Es wird positive Infektion angenommen.

12) *Alchim. Lapeyrousei* Bus. 1. Juli. Fremdinfektionen verunmöglichen die Kontrolle.

13) *Alchim. intermedia* Clairv. 29. Juni. (5, 3i). Von den 3 Infektionsblättern sind 2 abgestorben. Das 3. trägt an der Infektionsstelle leichtes Mycel. Die Infektionsgrenzen sind ziemlich scharf gezeichnet. Kontrollstellen dieses Blattes frei, dagegen trägt ein nicht infiziertes Blatt starke Fremdinfektion.

1. Juli. Wie am 29. Juni. Starke Konidienbildung auf der Infektionsstelle. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

15) *Alchim. Faeroensis* Bus. 29. Juni. Fremdinfektionen verunmöglichen die Kontrolle.

Die folgenden Infektionspflanzen bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes infektionsfrei; *Alchim. micans* Bus., *Alchim.*

*flabellata* Bus., *Alch. sericata* Rchbg., *Alchim. alpina* L. vera und *Alchim. Hoppeana* Rchbg.

Reihe 25: Eingeleitet am 22. Juli 1907.

Infektionspflanzen:

| Vulgares:                      |  | Alpinae:                        |  |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 1. <i>Alch. connivens</i> Bus. |  | 11. <i>Alch. alpina</i> L. vera |  |
| 2. „ <i>impexa</i> Bus.        |  | 12. „ <i>Hoppeana</i> Rchbg.    |  |
| 3. „ <i>alpestris</i> Schmidt  |  | 13. „ <i>chirophylla</i> Bus.   |  |
| 4. „ <i>reniformis</i> Bus.    |  | 14. „ <i>conjuncta</i> Bab.     |  |
| 5. „ <i>pastoralis</i> Bus.    |  | 15. „ <i>alpigena</i> Bus.      |  |
| 6. „ <i>crinita</i> Bus.       |  | 16. „ <i>obovalis</i> Bus.      |  |
| 7. „ <i>micans</i> Bus.        |  | 17. „ <i>glacialis</i> Bus.     |  |
| 8. „ <i>multiflora</i> Bus.    |  | 18. „ <i>nitida</i> Bus.        |  |
| Calicinae:                     |  | 19. „ <i>pallens</i> Bus.       |  |
| 9. <i>Alch. fallax</i> Bus.    |  |                                 |  |
| 10. „ <i>flexicaulis</i> Bus.  |  |                                 |  |

Beobachtungen: 24. Juli. Sporenkeimung auf Objektträger beobachtet.

1) *Alchim. connivens* Bus. 26. Juli. (2, 2i). Beide Infektionsstellen sind gleichmäßig und scharf begrenzt infiziert. Eine Kontrollstelle zeigt winzige Fremdinfection.

27. Juli. Wie am 26. Juli. Schwache Konidienbildung. Es wird positive Infektion angenommen.

2) *Alchim. impexa* Bus. 26. Juli. (3, 3i). Sämtliche Infektionsstellen tragen gleichmäßiges, sehr scharf begrenztes Mycel; Kontrollstellen frei.

27. Juli. Gleiche Beobachtung wie am 26. Juli. Konidienbildung.

3) *Alchim. alpestris* Schmidt. 26. Juli. (3, 3i). Alle 3 Infektionsstellen sind stark, gleichmäßig und scharf begrenzt infiziert. Kontrollstellen frei.

27. Juli. Konidienbildung, sonst gleich 26. Juli.

5) *Alchim. pastoralis* Bus. 26. Juli. (2, 2i). Die 2 Infektionsstellen zeigen gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel. Kontrollstellen frei.

27. Juli. Wie am 26. Juli.

6) *Alchim. crinita* Bus. 26. Juli. (4, 4i). Sämtliche Infektionsstellen sind gleichmäßig und mit scharfer Begrenzung infiziert. Kontrollstellen frei.

27. Juli. Wie am 26. Juli.

9) *Alchim. fallax* Bus. 26. Juli. (3, 2i). Die 2 Infektionsstellen zeigen gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel. Kontrollstellen frei.

27. Juli. Konidienbildung, sonst gleich 26. Juli.

10) *Alchim. flexicaulis* Bus. 26. Juli. (2, 2i). Beide Infektionsstellen sind gleichmäßig und scharf begrenzt infiziert. Kontrollstellen frei.

27. Juli. Wie am 26. Juli.

11) *Alchim. alpina* L. vera. 26. Juli. (4, 4i). Ein Infektionsblatt zeigt an einem infizierten Blattlappen eine ganz kleine Gruppe von Konidienträgern. Die übrigen Infektionsstellen, wie die Kontrollstellen, sind frei.

27. Juli. Die kleine Gruppe der Konidienträger hat sich vergrößert; die übrigen Infektionsstellen und Kontrollstellen frei. Die Infektion konnte nicht länger beobachtet werden. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

Die folgenden Infektionspflanzen bleiben während der ganzen Dauer

des Experimentes infektionsfrei: *Alchim. reniformis* Bus., *Alch. micans* Bus., *Alch. multiflora* Bus., *Alch. Hoppeana* Rchbg., *Alch. chirophylla* Bus., *Alch. conjuncta* Bab., *Alch. alpigena* Bus., *Alch. obovalis* Bus., *Alch. glacialis* Bus., *Alch. nitida* Bus. und *Alch. pallens* Bus.

Reihe 26: Eingeleitet am 30. August 1907.

Infektionspflanzen:

| Vulgares:                          |  | Splendentes:                    |  |
|------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 1. <i>Alch. micans</i> Bus.        |  | 7. <i>Alch. Faeroensis</i> Bus. |  |
| 2. „ <i>multiflora</i> Bus.        |  | Alpinae:                        |  |
| Pubescentes:                       |  | 8. <i>Alch. alpina</i> L. vera  |  |
| 3. <i>Alch. pubescens</i> Lam.     |  | 9. „ <i>Hoppeana</i> Rchbg.     |  |
| 4. „ <i>flabellata</i> Bus.        |  | 10. „ <i>grossidens</i> Bus.    |  |
| 5. „ <i>intermedia</i> Clairv.     |  | 11. „ <i>chirophylla</i> Bus.   |  |
| Calicinae:                         |  | 12. „ <i>alpigena</i> Bus.      |  |
| 6. <i>Alch. glaberrima</i> Schmidt |  | 13. „ <i>glacialis</i> Bus.     |  |
|                                    |  | 14. „ <i>nitida</i> Bus.        |  |

Beobachtungen:

3) *Alchim. pubescens* Lam. 4. September. Infektionsfrei. 9. September. (2, 2i). Ein Infektionsblatt zeigt an der Infektionsstelle gleichmäßiges, starkes, scharf begrenztes Mycel. Die andere Infektionsstelle, wie die Kontrollstellen, frei. Es wird positive Infektion angenommen.

6) *Alchim. glaberrima* Schmidt. 9. September. Fremdinfectionen verunmöglichen die Kontrolle.

Die folgenden Infektionspflanzen bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes infektionsfrei: *Alchim. micans* Bus., *Alch. multiflora* Bus., *Alch. flabellata* Bus., *Alch. intermedia* Clairv., *Alch. Faeroensis* Bus., *Alch. alpina* L. vera, *Alch. Hoppeana* Rchbg., *Alch. grossidens* Bus., *Alch. chirophylla* Bus., *Alch. alpigena* Bus., *Alch. glacialis* Bus. und *Alch. nitida* Bus.

(Siehe Tabelle p. 39.)

Ergebnis der Infektionsreihen 24—26:

1) Für das Oidium auf *Alchimilla pubescens* Lam. waren die folgenden Vulgares-Species empfänglich: *Alchim. connivens* Bus., *impexa* Bus., *alpestris* Schmidt, *pastoralis* Bus. und *crinita* Bus. Immun verhielten sich: *Alchim. reniformis* Bus., *micans* Bus. und *multiflora* Bus.

2) Eigentümliche Infektionsresultate lieferte die Gruppe der Pubescentes: mit Sicherheit wurde nur die Wirtspflanze selber: *Alch. pubescens* Lam. infiziert. *Alch. intermedia* infizierte sich nur schwach (zweifelhaft), zudem störte eine Fremdinfection das Infektionsresultat. Es ist verwunderlich, daß *Alch. intermedia* sich durch das Oidium ihrer Verwandten *Alch. pubescens* nicht entschiedener zu infizieren vermag, da sie anderen Oidien gegenüber sich leicht empfänglich zeigte. Die Nichtinfektion der *Alch. flabellata* ist mit Vorsicht aufzunehmen, weil diese Art hie und da Fremdinfection zeigte, also von Natur aus keine immune Art ist. Dagegen scheint dies bei *Alch. sericata* Rchbg. zuzutreffen, die sich weder in diesen noch in anderen Experimenten jemals infizierte. *Alch. Lapeyrousei* hatte Fremdinfection.

3) Die beiden Calicinae-Species: *Alch. fallax* Bus. und *Alch.*

Tabelle zu den Infektionsreihen 24—26,  
ausgeführt mit Konidien von *A. pubescens* stammend.

| Infektionspflanzen                                | Reihe<br>24 | Reihe<br>25 | Reihe<br>26 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Vulgares:</b> <i>Alch. connivens</i> Bus.      | ?           | +           |             |
| " <i>impexa</i> Bus.                              | +           | +           |             |
| " <i>alpestris</i> Schmidt                        | +           | +           |             |
| " <i>reniformis</i> Bus.                          | —           | —           |             |
| " <i>pastoralis</i> Bus.                          | +           | +           |             |
| " <i>crinita</i> Bus.                             | +           | +           |             |
| " <i>micans</i> Bus.                              | —           | —           | —           |
| " <i>multiflora</i> Bus.                          |             | —           | —           |
| <b>Pubescentes:</b> <i>Alch. pubescens</i> Lam.   | +           |             | +           |
| " <i>flabellata</i> Bus.                          | —           |             | —           |
| " <i>intermedia</i> Clairv.                       | ?           |             | —           |
| " <i>Lapeyrousei</i> Bus.                         | o           |             |             |
| " <i>sericata</i> Rchbg.                          | —           |             |             |
| <b>Calicinae:</b> <i>Alch. glaberrima</i> Schmidt |             |             | o           |
| " <i>fallax</i> Bus.                              | o           | +           |             |
| " <i>flexicaulis</i> Bus.                         | ?           | +           |             |
| <b>Splendentes:</b> <i>Alch. Faeroensis</i> Bus.  | o           |             | —           |
| <b>Alpinae:</b> <i>Alch. alpina</i> L. vera       | —           | ?           | —           |
| " <i>Hoppeana</i> Rchbg.                          | —           | —           | —           |
| " <i>grossidens</i> Bus.                          |             | —           | —           |
| " <i>chirophylla</i> Bus.                         |             | —           | —           |
| " <i>conjuncta</i> Bab.                           |             | —           | —           |
| " <i>alpigena</i> Bus.                            |             | —           | —           |
| " <i>obovalis</i> Bus.                            |             | —           | —           |
| " <i>glacialis</i> Bus.                           |             | —           | —           |
| " <i>nitida</i> Bus.                              |             | —           | —           |
| " <i>pallens</i> Bus.                             |             | —           | —           |

Erklärung der Zeichen: + bedeutet positive, — negative, ? zweifelhafte Infektion, o Fremdinfection.

*flexicaulis* Bus. zeigten sich gut empfänglich; *Alch. glaberrima* störte das Experiment durch Fremdinfection.

4) *Alch. Faeroensis* (Splendentes) hatte in Reihe 24 Fremdinfection, in Reihe 26 blieb sie immun. Auch dieses negative Resultat ist unsicher.

5) Sämtliche Alpinae blieben für das vorliegende *Oidium* unempänglich. Nur *Alch. alpina* L. vera lieferte in Reihe 25 ein „zweifelhafte“ Infektionsresultat.

### VIII. *Oidium* von *Alchimilla Paicheana* Bus. stammend.

(Das Material stammt her von einer infizierten Topfpflanze im Botan. Garten in Bern.)

Reihe 27: Eingeleitet am 12. Juni 1907.

Infektionspflanzen:

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vulgares:</b>                 | <b>Alpinae:</b>                |
| 1. <i>Alch. impexa</i> Bus.      | 8. <i>Alch. alpina</i> L. vera |
| 2. " <i>pastoralis</i> Bus.      | 9. " <i>Hoppeana</i> Rchbg.    |
| 3. " <i>micans</i> Bus.          | 10. " <i>chirophylla</i> Bus.  |
| <b>Pubescentes:</b>              | 11. " <i>conjuncta</i> Bab.    |
| 4. <i>Alch. pubescens</i> Lam.   | 12. " <i>pallens</i> Bus.      |
| 5. " <i>intermedia</i> Clairv.   |                                |
| <b>Splendentes:</b>              |                                |
| 6. <i>Alch. splendens</i> Christ |                                |
| 7. " <i>Faeroensis</i> Bus.      |                                |

Beobachtungen: 13. Juni. Sporenkeimung auf Objektträger beobachtet.

1) *Alch. impexa* Bus. 16. Juni. Sämtliche drei Infektionsstellen sind gleichmäßig und scharf begrenzt infiziert. Kontrollstellen frei. 17. Juni. Wie am 16. Juni. Konidienbildung.

2) *Alch. pastoralis* Bus. 18. Juni. Fremdinfektionen verunmöglichen die Kontrolle.

4) *Alch. pubescens* Lam. 17. Juni. Fremdinfektionen verunmöglichen die Kontrolle.

5) *Alch. intermedia* Clairv. 16. Juni. Eine Infektionsstelle zeigt gleichmäßiges Mycel, das die Infektionsgrenzen ziemlich scharf bezeichnet. Eine Kontrollstelle hat ziemlich starke Fremdinfektion.

18. Juni. 2 Infektionsstellen sind gleichmäßig, mit ziemlich scharfer Begrenzung infiziert. Verschiedene Kontrollstellen tragen aber Fremdinfektionen. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

6) *Alch. splendens* Christ. 16. Juni. Die Infektionsstellen sind frei. Eine Kontrollstelle zeigt leichte Fremdinfektion.

18. Juni. Wie am 16. Juni. Es wird Nichtinfektion angenommen.

7) *Alch. Faeroensis* Bus. 17. Juni. Sämtliche Infektionsstellen zeigen stellenweise Mycel, das nicht über die Infektionsgrenzen hinausgreift. Kontrollstellen frei.

18. Juni. Die Infektionsstellen sind gleichmäßig und scharf begrenzt infiziert. Kontrollstellen frei.

Die folgenden Infektionspflanzen bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes infektionsfrei: *Alch. micans* Bus., *Alch. alpina* L. vera, *Alch. Hoppeana* Rchbg., *Alch. chirophylla* Bus., *Alch. conjuncta* Bab. und *Alch. pallens* Bus.

#### Ergebnis der Infektionsreihe 27:

1) Das Oidium auf *Alchim. Paicheana* Bus. (*Splendentes*) infizierte die *Vulgares-Species*: *Alchim. impexa* Bus., während *Alchim. micans* Bus. immun blieb. *Alchim. pastoralis* Bus. hatte Fremdinfektion.

2) Der Infektionsversuch mit der *Pubescentes-Species*: *Alchim. intermedia* Clairv. ergab ein „zweifelhafte“ Resultat; *Alchim. pubescens* Lam. hatte Fremdinfektion.

3) Von den *Splendentes* blieb *Alchim. splendens* Christ. unempfindlich, während *Alchim. Faeroensis* sich infizierte.

4) Die *Alpinae*: *Alchim. alpina* L. vera, *Hoppeana* Rchbg., *chirophylla* Bus., *conjuncta* Bab. und *Alchim. pallens* Bus. waren für das vorliegende Oidium unempfindlich. Es muß aber hier darauf aufmerksam gemacht werden, daß das Experiment aus technischen Gründen früh abgebrochen werden mußte; infolgedessen sind die Beobachtungen, namentlich der *Alpinae*, die sich oft erst nach 6—7 Tagen infizieren, unzureichend.

#### IX. Oidium von *Alchimilla nitida* Bus. stammend.

(Das Material stammt her von einer infizierten Topfpflanze im Botan. Garten in Bern.)

Reihe 28: Eingeleitet am 25. Juni 1907.

Infektionspflanzen:

- Vulgares:  
1. *Alch. connivens* Bus.  
2. „ *impexa* Bus.  
3. „ *pastoralis* Bus.

- Pubescentes:  
4. *Alch. intermedia* Clairv.  
Calicinae:  
5. *Alch. flexicaulis* Bus.

|                         |  |                         |
|-------------------------|--|-------------------------|
| Alpinae:                |  | 10. Alch. obovalis Bus. |
| 6. Alch. alpina L. vera |  | 11. „ glacialis Bus.    |
| 7. „ Hoppeana Rchbg.    |  | 12. „ nitida Bus.       |
| 8. „ chirophylla Bus.   |  | 13. „ pallens Bus.      |
| 9. „ conjuncta Bab.     |  |                         |

#### Beobachtungen:

1) Alchim. connivens Bus. 1. Juli. (2, 2i). Das eine Infektionsblatt hat zwei Infektionsstellen. Beide tragen gleichmäßig schwaches, scharf begrenztes Mycel. Kontrollstellen dieses Blattes frei. Das andere Infektionsblatt zeigt starke Fremdinfectionen, sowohl auf Infektions- wie auf Kontrollstellen.

2. Juli. Wie am 1. Juli. Die Fremdinfectionen haben sich vergrößert. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

2) Alchim. impexa Bus. 1. Juli. (2, 2i). Beide Infektionsstellen zeigen gleichmäßiges, schwaches, scharf begrenztes Mycel. Teilweise kann schwache Konidienbildung konstatiert werden. Kontrollstellen frei.

2. Juli. Die Infektion ist gleichmäßig, aber ohne große Kraft. Die Konidienbildung ist schwach. Kontrollstellen frei.

4) Alchim. intermedia Clairv. 1. Juli. (4, 3i). 2 Infektionsblätter und ein Kontrollblatt sind abgestorben. Das übrig gebliebene Infektionsblatt zeigt an der Infektionsstelle einige Konidienträger. Kontrollstellen frei.

2. Juli. An der Infektionsstelle ist stellenweise schwaches Mycel vorhanden. Schwache Konidienbildung. Die Infektionsgrenzen sind wegen der Kleinheit des Blattes kaum festzustellen. Kontrollstellen frei. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

5) Alchim. flexicaulis Bus. Fremdinfectionen verunmöglichen die Kontrolle.

11) Alchim. glacialis Bus. 2. Juli. Die Infektionsstellen sind frei. Eine Kontrollstelle zeigt kleine Fremdinfection.

3. Juli. Wie am 2. Juli. Es wird Nichtinfektion angenommen.

12) Alchim. nitida Bus. 1. Juli. (4, 3i). 2 Infektionsstellen tragen ganz schwaches Mycel, das einige Konidienträger zeigt. Sämtliche Kontrollstellen sind frei.

2. Juli. Sämtliche Infektionsstellen sind stellenweise infiziert. Die Infektion besteht in schwachem Mycel und einigen Konidienträgern. Alle Kontrollstellen sind frei.

3. Juli. 3 Infektionsstellen zeigen starke Entwicklung der Konidienbildung; die 3. Infektionsstelle ist schwach infiziert. Kontrollstellen frei. Es wird positive Infektion angenommen.

Die folgenden Infektionspflanzen bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes infektionsfrei: Alchim. pastoralis Bus., Alchim. alpina L. vera, Alchim. Hoppeana Rchbg., Alchim. chirophylla Bus., Alchim. conjuncta Bab., Alchim. obovalis Bus. und Alchim. pallens Bus.

#### Reihe 29: Eingeleitet am 3. Juli 1907.

##### Infektionspflanzen:

|                      |  |                         |  |
|----------------------|--|-------------------------|--|
| Vulgares:            |  | Pubescentes:            |  |
| 1. Alch. impexa Bus. |  | 7. Alch. pubescens Lam. |  |
| 2. „ reniformis Bus. |  | 8. „ sericata Rchbg.    |  |
| 3. „ versipila Bus.  |  | Calicinae:              |  |
| 4. „ pastoralis Bus. |  | 9. Alch. fallax Bus.    |  |
| 5. „ crinita Bus.    |  | 10. „ flexicaulis Bus.  |  |
| 6. „ micans Bus.     |  |                         |  |

|           |                  |                 |                             |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------------------|
|           | Alpinae:         |                 |                             |
| 11. Alch. | alpina L. vera   | 16. "           | obovalis Bus.               |
| 12. "     | Hoppeana Rehb.   | 17. "           | glacialis Bus.              |
| 13. "     | chirophylla Bus. | 18. "           | nitida Bus.                 |
| 14. "     | conjuncta Bab.   |                 | Bastarde:                   |
| 15. "     | alpigena Bus.    | 19. Alch. glac. | × pentaph. =<br>gemmia Bus. |

### Beobachtungen:

1) Alchim. impexa Bus. 8. Juli. (3, 3i). Die 3 Infektionsstellen sind gleichmäßig und scharf begrenzt infiziert. Kontrollstellen frei.

10. Juli. Wie am 8. Juli. Mittelstarke Konidienbildung.

2) Alchim. reniformis Bus. 8. Juli. (2, 2i). Die 2 Infektionsblätter haben 3 Infektionsstellen. Diese sind alle schwach und gleichmäßig, mit ziemlich scharfer Begrenzung, infiziert. Allein verschiedene Kontrollstellen tragen Fremdinfectionen.

10. Juli. Wie am 8. Juli. Die Fremdinfectionen haben sich noch vermehrt. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

3) Alchim. versipila Bus. 8. Juli. Fremdinfectionen verunmöglichen die Kontrolle.

4) Alchim. pastoralis Bus. 10. Juli. (3, 2i). Die 2 Infektionsblätter wurden an 3 Stellen infiziert. Davon trägt eine Infektionsstelle stellenweise Mycel. Die Infektionsgrenzen sind nirgends überschritten. Die 2 anderen Infektionsstellen, wie die Kontrollstellen, sind frei.

12. Juli. 2 Infektionsstellen sind gleichmäßig und scharf begrenzt infiziert. Die 3. Infektionsstelle, wie die Kontrollstellen, frei. Es wird positive Infektion angenommen.

4) Alchim. crinita Bus. 10. Juli. (4, 2i). Beide Infektionsstellen zeigen stellenweise Mycel mit ziemlich scharfer Begrenzung. Schwache Konidienbildung. Kontrollstellen frei.

12. Juli. Wie am 10. Juli. Da das Mycel die Infektionsfläche nur stellenweise einnimmt, muß die Infektion als „zweifelhafte“ bezeichnet werden.

9) Alchim. fallax Bus. 10. Juli. (8, 4i). Sämtliche Infektionsstellen sind frei. Ein nicht infiziertes Blatt zeigt 2 Fremdinfectionen.

12. Juli. Wie am 10. Juli. Es wird Nichtinfektion angenommen.

10) Alchim. flexicaulis Bus. 10. Juli. Fremdinfectionen verunmöglichen die Kontrolle.

11) Alchim. alpina L. vera. 8. Juli. Eine Peronospora hat die Blätter abgetötet.

15) Alchim. alpigena Bus. 10. Juli. Infektionsfrei.

12. Juli. (3, 2i). Ein Infektionsblatt und ein Kontrollblatt sind abgestorben. Das übrig gebliebene Infektionsblatt hat 3 Infektionsstellen. Davon tragen 2 Stellen schwaches Mycel mit einigen Konidienträgern. Die 3. Infektionsstelle, wie die Kontrollstellen, sind frei. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

16) Alchim. obovalis Bus. 8. Juli. (2, 2i). Ein Infektionsblatt hat 2 Infektionsstellen. Davon trägt eine einige Mycelfäden. Die anderen Infektionsstellen, wie die Kontrollstellen, sind frei.

10. Juli. Das Mycel hat sich an der infizierten Stelle ausgebreitet; sonst gleich 8. Juli.

12. Juli. Schwache Konidienbildung; im übrigen gleich 10. Juli. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

17) Alchim. glacialis Bus. 10. Juli. (4, 3i). 2 Infektionsblätter



tragen an je 2 Infektionsstellen eine Konidiengruppe. Das 3. Infektionsblatt, sowie sämtliche Kontrollstellen, frei.

12. Juli. Wie am 10. Juli. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

18) *Alchim. nitida* Bus. 10. Juli. (4, 3i). 2 Infektionsblätter sind abgestorben. Das 3. Infektionsblatt ist an 2 Infektionsstellen infiziert. Die Infektion besteht in schwachem Mycel und einigen Konidienträgern. Kontrollstellen frei.

12. Juli. Das übrig gebliebene Infektionsblatt zeigt an beiden infizierten Stellen gleichmäßiges Mycel mit mittelstarker Konidienbildung. Kontrollstellen frei. Es wird positive Infektion angenommen.

19) *Alchim. gemmia* Bus. 8. Juli. Fremdinfectionen verunmöglichen die Kontrolle.

Die folgenden Infektionspflanzen bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes infektionsfrei: *Alchim. micans* Bus., *Alchim. pubescens* Lam., *Alchim. sericata* Rchbg., *Alchim. Hoppeana* Rchbg., *Alchim. chirophylla* Bus. und *Alchim. conjuncta* Bab.

Tabelle zu den Versuchsreihen 28 und 29,  
ausgeführt mit Konidien von *A. nitida* stammend.

| Infektionspflanzen  | Reihe<br>28 | Reihe<br>29 |
|---|-------------|-------------|
| Vulgares: <i>Alch. connivens</i> Bus.                     | ?           | —           |
| „ <i>impexa</i> Bus.                                      | +           | +           |
| „ <i>reniformis</i> Bus.                                  | —           | ?           |
| „ <i>versipila</i> Bus.                                   | —           | o           |
| „ <i>pastoralis</i> Bus.                                  | —           | +           |
| „ <i>crinita</i> Bus.                                     | —           | ?           |
| „ <i>micans</i> Bus.                                      | —           | —           |
| Pubescentes: <i>Alch. pubescens</i> Lam.                  | —           | —           |
| „ <i>intermedia</i> Clairv.                               | ?           | —           |
| „ <i>sericata</i> Rchbg.                                  | —           | —           |
| Calicinae: <i>Alch. fallax</i> Bus.                       | —           | —           |
| „ <i>flexicaulis</i> Bus.                                 | o           | o           |
| Alpinae: <i>Alch. alpina</i> L. vera                      | —           | —           |
| „ <i>Hoppeana</i> Rchbg.                                  | —           | —           |
| „ <i>chirophylla</i> Bus.                                 | —           | —           |
| „ <i>conjuncta</i> Bab.                                   | —           | —           |
| „ <i>alpigena</i> Bus.                                    | —           | ?           |
| „ <i>obovalis</i> Bus.                                    | —           | ?           |
| „ <i>glacialis</i> Bus.                                   | —           | ?           |
| „ <i>nitida</i> Bus.                                      | +           | +           |
| „ <i>pallens</i> Bus.                                     | —           | —           |
| Bastarde: <i>Alch. gemmia</i> Bus. (glacialis × pentaph.) | —           | o           |

Erklärung der Zeichen: + bedeutet positive, — negative, ? zweifelhafte Infektion; o bedeutet Fremdinfection.

#### Ergebnis der Infektionsreihen 28 und 29.

1) Von den Vulgares-Species infizierten sich durch das *Oidium* auf *Alchim. nitida* Bus.: *Alchim. impexa* Bus. und *Alchim. pastoralis* Bus. *Alchim. connivens* Bus., *Alchim. reniformis* Bus. und *Alchim. crinita* Bus. werden durch das verwendete *Oidium* wahrscheinlich auch infiziert; doch konnte dies nicht mit voller Sicherheit festgestellt werden. *Alchim. versipila* Bus. hatte Fremdinfection; *Alchim. micans* Bus. infizierte sich nicht. Doch ist bei

diesem letzteren negativen Resultate darauf zu achten, daß *Alchim. pastoralis* Bus. sich in Reihe 28 nicht infizierte, während sie sich in Reihe 29 empfänglich zeigte. — Im allgemeinen muß konstatiert werden, daß sich die *Vulgares* dem *Oidium* auf *Alchim. nitida* Bus. gegenüber durch einen geringeren Grad von Empfänglichkeit auszeichnen, als dies in früheren Experimenten mit anderen *Oidien* der Fall war. Die Infektion kann als „zögernd“ bezeichnet werden. Selbst die sonst so leicht infizierbare *Alchim. impexa* Bus. infizierte sich nur schwach bis mittelstark.

2) Von den *Pubescentes* lieferte *Alchim. intermedia* Clairv. ein „zweifelhaftes“ Infektionsergebnis. Doch ist es sehr wahrscheinlich, daß sie durch das verwendete *Oidium* infiziert werden kann. *Alchim. pubescens* Lam. und *Alchim. sericata* Rchbg. infizierten sich nicht.

3) Die sonst ebenfalls gut empfängliche *Calicinae*-Species *Alchim. fallax* Bus. infizierte sich nicht. Ist dieses negative Resultat auch kein sicheres, so zeigt es doch, daß auch bei dieser Species das *Oidium* auf *Alchim. nitida* Bus. nicht über die gleiche Infektionskraft verfügt, wie die früher verwendeten *Oidien*. *Alchim. flexicaulis* Bus. hatte Fremdinfection.

4) Am eigentümlichsten berühren wieder die Infektionsergebnisse der *Alpinae*. Ist es auch sehr wahrscheinlich, daß die Species: *Alchim. alpigena* Bus., *Alchim. obovalis* Bus. und *Alchim. glacialis* Bus. durch das *Oidium* ihrer Verwandten *Alchim. nitida* Bus. infiziert werden können, so fällt doch auf, daß 2 von diesen 3 Species in Reihe 28 unempfindlich blieben und sich in Reihe 29 nur sehr schwach infizierten, und daß 5 andere Species der *Alpinae* sich überhaupt immun verhielten (3 davon sowohl in Reihe 28 wie in Reihe 29). Es ist also das *Oidium* auf *Alchim. nitida* Bus. auch bei den *Alpinae* selber durch eine geringe Infektionskraft ausgezeichnet.

5) *Alchim. gemmia* Bus. (Bastard) hatte Fremdinfection.

## X. *Oidium* von *Alchimilla alpigena* Bus. stammend.

(Das Material stammt her von einer infizierten Topfpflanze im Botan. Garten in Bern.)

Reihe 30: Eingeleitet am 19. Juli 1907.

Infektionspflanzen:

| Vulgares:               |  | Alpinae:                |  |
|-------------------------|--|-------------------------|--|
| 1. Alch. impexa Bus.    |  | 7. Alch. alpina L. vera |  |
| 2. „ pastoralis Bus.    |  | 8. „ Hoppeana Rchbg.    |  |
| 3. „ crinita Bus.       |  | 9. „ conjuncta Bab.     |  |
| 4. „ micans Bus.        |  | 10. „ alpigena Bus.     |  |
| Pubescentes:            |  | 11. „ obovalis Bus.     |  |
| 5. Alch. pubescens Lam. |  | 12. „ nitida Bus.       |  |
| Calicinae:              |  | 13. „ pallens Bus.      |  |
| 6. Alch. fallax Bus.    |  |                         |  |

Beobachtungen:

1) *Alchim. impexa* Bus. 24. Juli. (3, 3i). 2 Infektionsstellen (von 4) zeigen einige Mycelfäden und einige Konidienträger. Die 3. Infektionsstelle, wie die Kontrollstellen, frei.

25. Juli. Von 4 Infektionsstellen zeigen 3 schwaches Mycel, teilweise mit Konidienbildung. Kontrollstellen frei.

26. Juli. Die 3 infizierten Stellen tragen schwaches Mycel mit schwacher Konidienbildung. Die Infektionsgrenzen sind scharf. Kontrollstellen frei.

6) *Alchim. fallax* Bus. 24. Juli. Fremdinfectionen verunmöglichen die Kontrolle.

10) *Alchim. alpigena* Bus. 23. Juli. (6, 4i). Ein Infektionsblatt hat an einer von 3 Infektionsstellen eine kleine Gruppe von Konidienträgern. Die anderen Infektionsstellen, wie die Kontrollstellen, sind frei.

24. Juli. Wie am 23. Juli.

26. Juli. Die infizierte Stelle trägt äußerst schwaches Mycel mit ca. 10 Konidienträgern; sonst gleich 23. Juli. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

11) *Alchim. obovalis* Bus. 23. Juli. (3, 2i). Das eine Infektionsblatt ist abgestorben. Das andere zeigt an einer von 2 Infektionsstellen einige Mycelfäden. Kontrollstellen frei. 24. Juli. Die Infektion hat keine Fortschritte gemacht.

25. Juli. Das Infektionsblatt ist abgestorben. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

12) *Alchim. nitida* Bus. 23. Juli. (5, 4i). 2 Infektionsblätter tragen an je einer Infektionsstelle eine kleine Gruppe von Konidienträgern. Die anderen Infektionsstellen, wie die Kontrollstellen, sind frei.

24. Juli. Es kann nur noch an einer Infektionsstelle eine Konidienträgergruppe konstatiert werden. Die andere, am 23. Juli infizierte Stelle, ist infektionsfrei.

26. Juli. Außer der am 24. Juli infizierten Stelle trägt eine Kontrollstelle eine Konidiengruppe. Es wird „zweifelhafte“ Infektion angenommen.

Die folgenden Infektionspflanzen bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes infektionsfrei: *Alchim. pastoralis* Bus., *Alchim. crinita* Bus., *Alchim. micans* Bus., *Alchim. pubescens* Lam., *Alchim. alpina* L. vera, *Alchim. Hoppeana* Rchbg., *Alchim. conjuncta* Bab. und *Alchim. pallens* Bus.

#### Ergebnis der Infektionsreihe 30:

1) Von den Vulgares wurde einzig *Alchim. impexa* Bus. infiziert. Nicht infiziert wurden: *Alchim. pastoralis* Bus., *crinita* Bus. und *micans* Bus. Wir erkennen auch hier deutlich die geringe Infektionskraft des Oidiums auf dieser Alpinae-Species. Die Infektion der *Alchim. impexa* Bus. zeigt ebenfalls eine sehr geringe Kraft. Es steht diese Beobachtung im Gegensatz zu den Erfahrungen, die mit dieser Species in früheren Experimenten gemacht wurde, wo sie sich stets sehr schnell und stark infizierte.

2) *Alchim. pubescens* Lam. wurde nicht infiziert.

3) *Alchim. fallax* Bus. (Calicinae) hatte Fremdinfection.

4) Von den Alpinae wurde die eigene Wirtspflanze, *Alchim. alpigena* Bus., selber so schwach infiziert, daß ihre Infektion als „zweifelhafte“ bezeichnet werden mußte. Das gleiche gilt von den 2 anderen Species: *Alchim. obovalis* Bus. und *Alchim. nitida* Bus., deren Infektion durch das vorliegende Oidium sehr wahrscheinlich ist. Nicht infiziert wurden: *Alchim. alpina* L. vera, *Hoppeana* Rchbg., *conjuncta* Bab. und *pallens* Bus. Wenn wir die Infektionsergebnisse dieses Oidiums mit den Infektionsresultaten des Oidiums auf *Alchim. nitida* Bus. vergleichen, so erhalten wir einen durchaus einheitlichen Eindruck: beide Oidien werden charakterisiert durch eine geringe Infektionskraft, auch solchen Species gegenüber, die sonst sehr leicht infizierbar sind.

## **XI. Oidium von Sanguisorba officinalis stammend.**

(Das Material wurde in Biel-Brüggmoos im Freien gesammelt.)

**Reihe 31:** Eingeleitet am 25. Juni 1907.

**Infektionspflanzen:**

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Sanguisorba officinalis | 6. Rubus odoratus     |
| 2. „ minor                 | 7. Spiraea Ulmaria    |
| 3. „ muricata              | 8. „ Filipendula      |
| 4. „ dodecandra            | 9. Alch. crinita Bus. |
| 5. Potentilla glandulosa   |                       |

**Bemerkung:** In diesem Experimente wurden ganze Topfpflanzen verwendet. Jede Infektionspflanze erhielt ein Kontroll Exemplar, das unter gleiche Bedingungen gestellt wurde. Die Infektion geschah durch Aufbrausen von in Wasser suspendierten Sporen.

**Beobachtungen:**

3. Juli. Sämtliche Pflanzen sind infektionsfrei.

5. Juli. Bei Sanguisorba officinalis sind sämtliche Blätter bis auf 2 abgestorben. Sämtliche Pflanzen sind infektionsfrei.

18. Juli. Bei Sanguisorba officinalis haben sich neue Triebe und Blätter entwickelt. Diese sind alle infektionsfrei. Dagegen tragen jene älteren, übrig gebliebenen zwei Blätter reichliche Infektion, bestehend in dichtem Mycel, das pulverige Sporenmassen und teilweise sogar junge Perithezien trägt. Es ist durch diesen Unterschied zwischen älteren und jüngeren Blättern deutlich zu erkennen, daß die Infektion von der Impfung am 25. Juni herrühren muß. Sämtliche übrigen Infektionspflanzen sind infektionsfrei, ebenso sind die Kontrollpflanzen ohne Infektion.

**Ergebnis der Infektionsreihe 31:** Das Oidium auf Sanguisorba officinalis vermochte nicht, 3 andere Species des Genus Sanguisorba zu infizieren. Ebenso zeigten sich die Genera Spiraea, Potentilla, Rubus und Alchimilla für das verwendete Oidium unempfindlich.

## **XII. Oidium von Humulus lupulus stammend.**

(Das Material wurde in Davos-Platz im Freien gesammelt.)

**Reihe 32:** Eingeleitet am 12. August 1907.

**Infektionspflanzen:**

1. Humulus lupulus
2. „ japonicus
3. Potentilla glandulosa
4. Alchimilla connivens Bus.
5. Taraxacum officinale

**Beobachtungen:**

14. August. Sporenkeimung auf Objektträger beobachtet.

1) Humulus lupulus. 19. August. (4, 3i). Eine Infektionsstelle zeigt leichtes, gleichmäßiges Mycel, teilweise mit Konidien. Die Infektionsgrenzen sind ziemlich scharf gezeichnet. Die anderen Infektionsstellen, wie die Kontrollstellen, sind frei.

21. August. 2 Infektionsstellen tragen gleichmäßiges Mycel mit scharfer Begrenzung. Kontrollstellen frei. Es wird positive Infektion angenommen.

2) Humulus japonicus. 19. August. (4, 4i). Sämtliche Infektionsstellen zeigen gleichmäßiges, scharf begrenztes Mycel mit Konidienbildung. Kontrollstellen frei.

21. August. Wie am 19. August. Starke Konidienbildung. Es wird positive Infektion angenommen.

Die anderen Versuchspflanzen: *Potentilla glandulosa*, *Alch. connivens* Bus. und *Taraxacum officinale* bleiben während der ganzen Dauer des Experimentes infektionsfrei.

Ergebnis der Infektionsreihe 32: Das *Oidium* auf *Humulus lupulus* infizierte *Humulus lupulus* und *Humulus japonicus*; *Potentilla glandulosa*, *Alch. connivens* Bus. und *Taraxacum officinale* blieben für dieses *Oidium* unempfindlich.

Die Nichtinfektion von *Taraxacum officinale* durch das *Oidium* auf *Humulus lupulus* steht in Widerspruch mit dem Experimente von Magnus (14), das eine Infektion von *Taraxacum* ergab. Ebenso widerspricht dieser Nichterfolg einem Versuchsergebnis, das ich im Herbst 1906 gewann. Ich infizierte am 26. September 1906 2 Topfpflanzen von *Taraxacum officinale* durch das *Oidium* auf *Humulus lupulus*. Topf No. 1 wurde durch Aufbrausen suspendierter Sporen infiziert; bei Topf No. 2 wurden bezeichnete Blätter durch das mit Sporen beladene Skalpell infiziert. 2 Kontrollpflanzen wurden unter gleiche Verhältnisse gebracht. Am 3. Oktober, also 7 Tage nach der Infektion, trugen 3 bezeichnete Blätter von Topf No. 2 deutliche Mycelflecken. Diese zeigten schwache Konidienbildung; es wurden sogar einige Perithezien gefunden, bei denen aber im Innern nur eine körnige Protoplasma- und keine Ascosporen gefunden wurden. Die nicht bezeichneten Blätter dieses Topfes blieben frei. Ebenso zeigten Topf No. 1, wie die Kontrollpflanzen, keine Infektion. Ich unternahm dieses Experiment noch zu verschiedenen Malen, sowohl im Herbst 1906, wie im Herbst 1907. Es gelang mir aber nie mehr, eine Infektion von *Taraxacum officinale* durch das *Oidium* auf *Humulus lupulus* hervorzurufen. Die Konidien von *Sphaerotheca Humuli* auf *Humulus lupulus* sind sehr oft durch einen anderen Pilz: *Cicinnobolus* geschädigt, so daß ein großer Teil der jeweiligen verwendeten Sporen keimunfähig ist. Verschiedene Infektionsmißerfolge sind sicher auf diesen Umstand zurückzuführen, namentlich gelang es mir im Herbst 1907 nicht, kräftiges Sporenmaterial zu erhalten.

(Siehe Generaltabelle p. 48.)

### C. Diskussion der Infektionsergebnisse.

Nachdem nun die Infektionskraft der einzelnen Oidien experimentell festgestellt ist, dürfen wir dazu übergehen, die einzelnen Infektionskreise miteinander zu vergleichen. Die beste Uebersicht wird uns für diese Vergleichung durch eine graphische Darstellung der Infektionskreise geboten. In der nachfolgenden Tafel wurden natürlich nur die auf Alchimillen wachsenden Oidien berücksichtigt, da die Oidien auf *Sanguisorba officinalis* und *Humulus lupulus* außerhalb dieses Gedankenganges stehen. Der Name des jeweiligen verwendeten Oidiums steht in dieser graphischen Darstellung im Raume des innersten, kleinsten Kreises. Die Peripherie des mittleren Kreises trägt die Namen der Versuchspflanzen; sämtliche 9 Figuren tragen dieselben Versuchspflanzen und in genau der gleichen Anordnung. Ein Vergleich mit der Generaltabelle zeigt, daß nicht sämtliche Versuchspflanzen eines Oidiums bei dieser graphischen Uebersicht berücksichtigt wurden. Es wurden diejenigen Pflanzen herausgegriffen, die die einzelnen Infektionskreise besonders charakterisieren, und die bei sämtlichen Oidien mehr oder weniger zur Verwendung kamen. Der äußerste Kreis trägt jeweils die Namen der

Generaltabelle (Reihen 1–32).

|  | Vulgares                          |                                  |                                    |                               | Calicinae                         |                               | Pubescentes                       | Splendentes                        | Alpinae                       |                                |                                   |                                  |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|  | I<br>Peribac. von<br>A. connivens | II<br>Oidium von<br>A. connivens | III<br>Oidium von<br>A. pastoralis | IV<br>Oidium von<br>A. impexa | V<br>Oidium von<br>A. flexicaulis | VI<br>Oidium von<br>A. fallax | VII<br>Oidium von<br>A. pubescens | VIII<br>Oidium von<br>A. Paicheana | IX<br>Oidium von<br>A. nitida | X<br>Oidium von<br>A. alpigena | XI<br>Oidium von<br>Sanguis. off. | XII<br>Oidium von<br>Humul. lup. |
| <b>Vulgares: Alch. connivens Bus.</b>      |                                   |                                  |                                    |                               |                                   |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| " impexa Bus.                              | +                                 | +                                | +                                  | +                             | +                                 | +                             | +                                 | +                                  | +                             | +                              |                                   |                                  |
| " alpestris Schmidt                        | +                                 | +                                | +                                  | +                             | +                                 | +                             | +                                 | +                                  | +                             | +                              |                                   |                                  |
| " reniformis Bus.                          |                                   | —                                | o                                  |                               | +                                 | +                             | —                                 |                                    | +                             |                                |                                   |                                  |
| " versipila Bus.                           |                                   |                                  | o                                  |                               | +                                 | +                             |                                   |                                    | +                             |                                |                                   |                                  |
| " pastoralis Bus.                          | +                                 | +                                | +                                  | +                             | +                                 | +                             | +                                 | o                                  | +                             | —                              |                                   |                                  |
| " crinita Bus.                             |                                   | +                                | +                                  | +                             | +                                 | +                             | +                                 |                                    | +                             | —                              |                                   |                                  |
| " micans Bus.                              |                                   | —                                | +                                  | +                             | +                                 | +                             | —                                 | —                                  | —                             | —                              | —                                 |                                  |
| " heteropoda Bus.                          |                                   |                                  |                                    |                               | +                                 |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| " coriacea Bus.                            |                                   | +                                | +                                  |                               | ?                                 |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| " demissa Bus.                             | —                                 | —                                | —                                  |                               |                                   |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| " multiflora Bus.                          |                                   | —                                | —                                  |                               | —                                 |                               | —                                 |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| <b>Pubescentes: Alch. pubescens Lam.</b>   |                                   |                                  |                                    |                               |                                   |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| " flabellata Bus.                          | —                                 | —                                | —                                  | —                             | —                                 |                               | +                                 | o                                  | —                             | —                              |                                   |                                  |
| " intermedia Clairv.                       | —                                 | +                                | +                                  |                               | +                                 | +                             | ?                                 | ?                                  | ?                             |                                |                                   |                                  |
| " sericata Rchbg.                          | —                                 | —                                | —                                  |                               |                                   | —                             | —                                 | —                                  | —                             |                                |                                   |                                  |
| " Lapeyrousei Bus.                         |                                   | —                                | —                                  |                               | o                                 |                               | o                                 |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| <b>Calicinae: Alch. glaberrima Schm.</b>   |                                   |                                  |                                    |                               |                                   |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| " incisa Bus.                              |                                   | o                                | o                                  |                               | o                                 |                               | o                                 |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| " fallax Bus.                              |                                   | ?                                | +                                  | +                             | +                                 | +                             | +                                 |                                    | —                             | o                              |                                   |                                  |
| " flexicaulis Bus.                         |                                   | +                                | +                                  | +                             | +                                 | +                             | +                                 |                                    | o                             |                                |                                   |                                  |
| " firma Bus.                               |                                   | +                                | +                                  |                               | +                                 |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| " acutiloba Stev.                          | —                                 | +                                |                                    |                               | o                                 |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| <b>Splendentes: Alch. splendens Christ</b> |                                   |                                  |                                    |                               |                                   |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| " Paicheana Bus.                           | o                                 | —                                |                                    | o                             | o                                 |                               |                                   | +                                  |                               |                                |                                   |                                  |
| " Faeroensis Bus.                          |                                   | —                                | o                                  |                               |                                   |                               | o                                 | +                                  |                               |                                |                                   |                                  |
| <b>Alpinae: Alch. alpina L. vera</b>       |                                   |                                  |                                    |                               |                                   |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| " Hoppeana Rchbg.                          |                                   | —                                | ?                                  | —                             | ?                                 |                               | ?                                 | —                                  | —                             | —                              |                                   |                                  |
| " grossidens Bus.                          | —                                 | —                                | ?                                  | —                             | —                                 | —                             | —                                 | —                                  | —                             | —                              |                                   |                                  |
| " pallens Bus.                             | —                                 |                                  | o                                  | —                             | —                                 | —                             | —                                 | —                                  | —                             | —                              |                                   |                                  |
| " conjuncta Bab.                           | —                                 |                                  | —                                  | —                             | —                                 | —                             | —                                 | —                                  | —                             | —                              |                                   |                                  |
| " alpigena Bus.                            |                                   |                                  | —                                  | —                             | ?                                 |                               | —                                 |                                    | ?                             | ?                              |                                   |                                  |
| " chirophylla Bus.                         |                                   |                                  | —                                  | —                             | ?                                 |                               | —                                 |                                    | +                             | ?                              |                                   |                                  |
| " nitida Bus.                              | o                                 | —                                | ?                                  | —                             | ?                                 | ?                             | —                                 |                                    | +                             | ?                              |                                   |                                  |
| " obovalis Bus.                            | —                                 | —                                | —                                  | —                             | —                                 |                               | —                                 |                                    | ?                             | ?                              |                                   |                                  |
| " glacialis Bus.                           | —                                 | —                                | o                                  | o                             | ?                                 | ?                             | —                                 |                                    | ?                             |                                |                                   |                                  |
| <b>Pentaphyllae: Alch. pentaphylla L.</b>  |                                   |                                  |                                    |                               |                                   |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| <b>Bastarde: Alch. trullata Bus.</b>       |                                   |                                  |                                    |                               |                                   |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| " gemmia Bus.                              |                                   | —                                |                                    |                               | —                                 |                               |                                   |                                    | o                             |                                |                                   |                                  |
| Taraxacum officinale                       |                                   |                                  |                                    |                               |                                   |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| Sanguisorba officinalis                    | —                                 |                                  |                                    |                               |                                   |                               |                                   |                                    |                               |                                | +                                 | —                                |
| " min., muricata, dodecandra               |                                   |                                  |                                    |                               |                                   |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| Potentilla heptaphylla                     | —                                 |                                  |                                    |                               |                                   |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| " glandulosa                               |                                   |                                  | —                                  |                               |                                   |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| Spiraea Ulmaria und Filipendula            | —                                 |                                  |                                    |                               |                                   |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| Fragaria vesca                             |                                   |                                  | —                                  |                               |                                   |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| Rubus odoratus                             |                                   |                                  | —                                  |                               |                                   |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| Viola canina                               |                                   |                                  | —                                  |                               |                                   |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| Geranium pratense                          |                                   |                                  | —                                  |                               |                                   |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| Plantago serpentina und montana            |                                   |                                  | —                                  |                               |                                   |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| Humulus lupulus und japonicus              |                                   |                                  | —                                  |                               |                                   |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   |                                  |
| Erodium moschatum                          |                                   |                                  | —                                  |                               |                                   |                               |                                   |                                    |                               |                                |                                   | +                                |

Zeichenerklärung der Generaltabelle: + bedeutet positive Infektion,  
— Nichtinfektion, ? zweifelhafte Infektion, o Fremdinfection.

**Bemerkung:** In den Tabellen am Schlusse der einzelnen Infektionsreihen eines Oidiums wurde jeweilen das Resultat jeder einzelnen Infektionsreihe hingesetzt. In der Generaltabelle sind diese Resultate verschiedener Reihen zu einem Resultate zusammengefaßt, so daß in jeder Kolonne nur noch ein einziges Zeichen steht. Ergaben sich beispielsweise für eine Art in den Versuchen 2 negative Resultate und ein positives Resultat, so wurde selbstverständlich das positive Resultat in die Generaltabelle aufgenommen.

einzelnen Abteilungen (*Vulgares*, *Pubescentes* etc.), in die die Arten des mittleren Kreises gehören. In bezug auf die Farbenverwendung verweise ich auf die unter der Tafel stehende Erklärung.

1) Um nun die einzelnen Infektionskreise miteinander zu vergleichen, stelle ich das Oidium auf *Alch. pastoralis* Bus. in den Mittelpunkt und verwende dasselbe als Maßstab für die anderen Oidien. Es geschieht dies deshalb, weil dieses Oidium die größte Zahl von Experimenten aufweist, seine Infektionsresultate also die sichersten sind, und weil bei ihm alle Versuchspflanzen, mit Ausnahme von *Alch. glacialis*, zur Verwendung kamen. Diesem Infektionskreise des Oidiums auf *Alch. pastoralis* geben vor allem die positiven Resultate (rote Sektoren) der *Alch. connixens*, *impexa*, *pastoralis*, *crinita*, *micans*, *intermedia*, *fallax* und *flexicaulis* ein charakteristisches Gepräge. Charakteristisch sind ferner die Nichtinfektionen von *Alch. Hoppeana*, *conjuncta*, *alpigena* und *obovalis*. Die zweifelhaften Infektionen der *Alch. pubescens*, *alpina vera* und *nitida* können insofern zur Charakteristik beitragen, als zweifelhafte Infektionen in der vorliegenden Arbeit zum größten Teile schwächere Stufen positiver Infektionen bedeuten und infolgedessen nicht gänzlich unentschiedene, bedeutungslose Resultate sein können.

2) Dem Infektionskreise des Oidiums auf *Alch. pastoralis* kommt derjenige des Oidiums auf *Alch. flexicaulis* Bus. am nächsten. Dieser Infektionskreis unterscheidet sich dadurch, daß die *Alch. pubescens* hier nicht infiziert ist, dort zweifelhaft, und daß *Alch. alpigena* hier zweifelhaft sich infizierte, während sie dort immun blieb. Diese Unterschiede sind äußerst gering: einer negativen Infektion steht in beiden Fällen eine zweifelhafte, also nicht eine entschiedene positive entgegen. Beide zweifelhafte Infektionen wurden ihrer Schwäche wegen in diese Kategorie eingereiht (Reihen 17 und 22). Die beiden Versuchspflanzen: *Alch. pubescens* und *Alch. alpigena* verhalten sich also den beiden Oidien gegenüber nicht direkt entgegengesetzt, sondern sie zeigen sich dem einen oder anderen Oidium gegenüber mehr oder weniger empfänglich. Die Uebereinstimmung der beiden Infektionskreise wird noch verstärkt durch die beiderseitige positive Infektion der *Alch. alpestris* Schmidt, welche in der Tafel nicht, in der Generaltabelle dagegen verzeichnet ist. Wir können des geringen Unterschiedes der beiden Infektionskreise wegen die beiden Oidien nicht als distinkte, biologische Arten auffassen; dazu gehören charakteristischere Unterschiede. Auf der anderen Seite dürfen wir die beiden Oidien auch nicht als ein- und dieselbe biologische Art zusammenfassen, besonders deshalb, weil sich die jeweilige negative Infektion der zwei in Betracht fallenden Arten in der Wiederholung bewährte. So kommen wir dazu, in Anlehnung an die Bezeichnung der morphologischen Arten, für diese Stufe der Spezialisierung den Namen einer „biologischen Unterart“ oder „kleinen biologischen Art“ einzuführen. Eine ganz ähnliche Erscheinung der Abstufungen einer biologischen Art wird

uns durch die Uredineen geboten. Ed. Fischer schreibt in dieser Beziehung: „Zudem besteht noch die weitere Schwierigkeit, daß nicht alle biologischen Arten gleich scharf voneinander abgegrenzt sind: wie bei den morphologischen Arten, so gibt es nämlich auch bei den biologischen verschiedene Abstufungen in bezug auf die Schärfe der Unterscheidung; so finden wir z. B. Formen, die nur dadurch voneinander abweichen, daß eine bestimmte Nährpflanze von der einen leichter befallen wird als von der anderen“ (17).

*Alchim. flexicaulis* ist, nach einer Bemerkung des Herrn R. Buser, obschon der Gruppe der *Calicinae* angehörend, eine Form, „welche den *Vulgares* am nächsten steht“. Der nicht große, systematische Unterschied hat also eine ebenfalls nicht große Verschiebung der Infektionskraft des auf *Alch. flexicaulis* wachsenden *Oidium*s zur Folge. Diese beiden Faktoren vermögen uns den Schluß nahezulegen, daß es die Angewöhnung an den neuen Wirt war, die den kleinen biologischen Unterschied der beiden *Oidien* hervorbrachte. Wir hätten hier eine durch Angewöhnung an einen Wirt sich entwickelnde biologische Art vor uns.

3) Als drittes in Vergleich zu ziehendes *Oidium* wähle ich dasjenige auf *Alchim. fallax*. *Alch. fallax* ist eine sehr nahe Verwandte der *Alchim. flexicaulis*. In Uebereinstimmung mit dieser systematischen Stellung haben wir hier, soviel wenigstens aus den Versuchen mit den nicht sehr zahlreichen Infektionspflanzen hervorgeht, eine vollständige Uebereinstimmung der Infektionskreise der *Oidien* auf *Alch. flexicaulis* und *Alch. fallax*. Die Einzelheiten dieser Uebereinstimmung wurden bereits am Fuße der Infektionsreihe 23 in der Zusammenfassung der Resultate hervorgehoben. Die *Oidien* auf *Alch. flexicaulis* und *Alch. fallax* wären demnach vorläufig als die gleiche biologische Art anzusehen.

4) Der Infektionskreis des *Oidium*s auf *Alchim. impexa* zeigt ebenfalls einen nur kleinen Unterschied gegenüber demjenigen des *Oidium*s auf *Alchim. pastoralis*. *Alchim. alpina vera* und *Alchim. nitida* wurden beide im Experiment mit diesem letzteren *Oidium* zweifelhaft, d. h. äußerst schwach infiziert (Reihe 15), während sie dem *Oidium* auf *Alchim. impexa* gegenüber immun blieben. Wir haben also hier das gleiche Verhältnis wie zwischen den *Oidien* auf *Alch. pastoralis* und *Alch. flexicaulis*. Die Infektion der beiden genannten Versuchspflanzen: *Alch. alpina vera* und *Alch. nitida* gleitet vom negativen Resultate des *Oidium*s auf *Alchim. impexa* zum zweifelhaften des *Oidium*s auf *Alch. pastoralis* hinüber. Ich bezeichne aus diesen Gründen auch dieses *Oidium* auf *Alch. impexa* als „kleine, biologische Art“.

5) Größer ist der Unterschied zwischen dem *Oidium* auf *Alch. connivens* und dem *Oidium* auf *Alch. pastoralis*. Es ist hier vor allem die Nichtinfektion der *Alchim. micans*, die das erstere *Oidium* stärker als die bisher genannten *Oidien* von letzterem unterscheidet. Die anderen sich nicht deckenden Infektionen betreffen solche Fälle, die bei dem einen *Oidium* mit negativer oder positiver Infektion, bei dem anderen *Oidium* mit zweifelhaftem Erfolge verliefen; es sind dies die Infektionen der Versuchspflanzen auf *Alch. pubescens*, *fallax* und *alpina vera*. Hier hätten wir also wieder eine gleitende Bewegung des sich unterscheidenden *Oidium*s auf *Alch. connivens* zu konstatieren. Nehmen wir an, daß einem Pilze zuerst ein größerer



Infektionskreis zusteht, und daß sich später dieser Infektionskreis durch Anpassung verkleinert (Bewegung der Infektionskraft von der Plurivorität zur Univorität), so käme unserem *Oidium* auf *Alch. connivens* eine höhere Stufe der Spezialisierung zu, indem sich die Anzahl der Wirtspflanzen bereits bemerkbar verkleinert hat.

Vergleichen wir dagegen das *Oidium* auf *Alch. impexa* mit dem *Oidium* auf *Alch. connivens*, so können wir, soviel uns die unvollkommenen Versuche mit dem ersteren *Oidium* uns dies gestatten, konstatieren, daß sich die beiden *Oidien* in der Infektion der *Alpinæ* decken, die Unterschiede also kleiner sind. Systematisch stehen nun *Alch. connivens* und *Alch. impexa* einander näher als *Alch. connivens* und *Alch. pastoralis*. Dagegen ist systematisch dieses letztere Verhältnis ein engeres, als dasjenige von *Alch. flexicaulis*, deren *Oidium* sich aber wenig von unserem Vergleichs-*Oidium* auf *Alch. pastoralis* unterschied, und von *Alch. pastoralis*. Warum die Größe des biologischen Artunterschiedes zweier *Oidien* nicht genau proportional ist der systematischen Stellung der zugehörigen Nährpflanzen, entzieht sich unserer Beobachtung und Beurteilung.

6) Fast auf gleicher Stufe der Spezialisierung wie das *Oidium* auf *Alch. connivens* steht das *Oidium* auf *Alchim. pubescens*. Auch hier haben wir als scharfen Unterschied gegenüber dem *Oidium* auf *Alch. pastoralis* die Nichtinfektion der *Alchim. micans*. Die anderen Unterschiede liegen auch hier wieder in einer gleitenden Infektionskraft der bezüglichen *Oidien*: *Alch. pubescens*, *intermedia* und *nitida* wurden bei dem einen *Oidium* negativ oder positiv, bei dem anderen aber jeweilen zweifelhaft infiziert. Es ist sicher gerechtfertigt, wenn wir dieses *Oidium* ebenfalls als eine „kleine, biologische Art“ ansehen, bei der aber die Spezialisierung sich bereits schärfer ausprägt als bei den *Oidien* auf *Alch. flexicaulis*, *fallax* und *impexa* (Nichtinfektion von *Alch. micans*). Systematisch ist *Alch. pubescens* der Typus für die besondere Gruppe der *Pubescentes*, welche sich wohl den stärker behaarten Formen der *Vulgares* (*Alch. pastoralis*, *crinita* etc.) nähert, obschon sie sich in anderer Beziehung von den *Vulgares* stark unterscheidet.

7) Der Infektionskreis des *Oidiums* auf *Alch. Paicheana* ist infolge der kleinen Zahl von Versuchspflanzen und von Experimenten nur mangelhaft gekennzeichnet. Am besten scheint mir sein Kreis mit demjenigen des *Oidiums* auf *Alch. pubescens* übereinzustimmen; einzig *Alch. alpina vera* verhielt sich bei den beiden *Oidien* verschieden: durch das *Oidium* auf *Alch. pubescens* wurde diese Art zweifelhaft, durch das vorliegende *Oidium* aber nicht infiziert. Ich glaube, einstweilen von einer näheren Charakteristik dieses *Oidiums* absehen zu müssen, und es vorläufig auf die gleiche Stufe wie das *Oidium* auf *Alch. pubescens* zu stellen.

8) Die 2 letzten *Oidien* sind diejenigen auf 2 alpinen Arten: *Alchim. nitida* und *Alchim. alpigena*. Vergleichen wir zunächst den Infektionskreis des *Oidiums* auf *Alchim. nitida* mit demjenigen auf *Alch. pastoralis*. Charakteristisch ist die Nichtinfektion der *Alchim. micans*. Diese Nichtinfektion hat dieses *Oidium* mit den *Oidien* auf *Alch. connivens* und *Alch. pubescens* gemein. Allein es kommt ein weiterer, bestimmter Unterschied dazu, die Nichtinfektion der *Alch. fallax*, einer Art, die gewöhnlich ziemlich leicht infiziert wurde. Die anderen Unterschiede gegenüber dem *Oidium* auf *Alch.*

*pastoralis* sind wieder solche, bei denen sich eine gleitende Infektion kundgibt, d. h. wobei die Unterschiede sich eigentlich mehr durch verschiedene Stufen der Infektionsstärke dokumentieren, als durch positive und negative Infektion. Ich verweise hier besonders auf die zweifelhaften Infektionen von *Alch. connivens* und *Alch. crinita*. Hierbei wurde die Infektion der *Alch. crinita*, einer Art, die sich sonst sicher und schnell infizierte, ihrer Schwäche wegen als zweifelhaft bezeichnet (Reihe 29). Die Infektionskraft dieses Oidiums hat, den *Vulgares* gegenüber, also bereits an Wucht verloren; von den 5 sonst ziemlich leicht infizierbaren Arten wurden nur noch 2 positiv infiziert. Die weiteren, bei dem Vergleichs-Oidium und dem vorliegenden Oidium sich nicht deckenden, zweifelhaften Infektionen betreffen die Species: *Alch. pubescens*, *intermedia*, *alpina vera*, *alpigena* und *obovalis*. Das Oidium auf *Alch. nitida* entfernt sich im Vergleich zu den anderen bisher behandelten Oidien am meisten von dem Vergleichs-Oidium auf *Alch. pastoralis*. Dieses Verhältnis der beiden Oidien deckt sich auch mit der systematischen Stellung der beiden Wirtspflanzen: die *Alpinae* bilden wohl außer den *Pentaphyllae* diejenige Gruppe, die sich morphologisch am weitesten von den *Vulgares* entfernt.

Das Oidium auf *Alchim. alpigena* ist nun aber, soviel aus dem etwas lückenhaften Infektionsbilde zu ersehen ist, noch um einen Schritt in der Spezialisierung weiter gegangen. *Alchim. pastoralis* und *Alchim. crinita* werden nicht mehr infiziert, im übrigen stimmt die Infektionskraft dieses Oidiums, mit Ausnahme der Infektionspflanze *Alch. nitida*, mit der Infektionskraft des Oidiums auf *A. nitida* überein.

Es ist notwendig, hier auf eine Eigentümlichkeit hinzuweisen, die vielleicht einen Schluß auf die Herkunft der Oidien auf alpinen Arten zulassen wird: Es gelang in den beschriebenen Experimenten nie, ein Oidium, das auf einer *Vulgares*-Species gewachsen war, mit vollständiger Sicherheit auf eine alpine Form zu übertragen. Dagegen infizierten sich umgekehrt *Alch. impexa* und *pastoralis* durch das Oidium auf *Alch. nitida*, und *Alch. impexa* durch das Oidium auf *Alch. alpigena*. Dieses Verhalten könnte uns den Schluß nahelegen, daß das Oidium auf alpinen Arten von infizierten *Vulgares*-Species herstamme. Dabei würde das dislozierte Oidium allerdings in seiner Infektionskraft modifiziert; allein dieselbe würde doch noch einen Teil ihrer ursprünglichen Wucht den *Vulgares*-Species gegenüber bewahren. In Einklang damit steht das Verhalten, daß die beiden Oidien auf *Alch. nitida* und *Alch. alpigena* die nächsten verwandten Infektionspflanzen, also auch wieder alpine Species, so schwach infizierten, daß die Infektionen als zweifelhafte bezeichnet werden mußten. Im Falle des Oidiums auf *Alch. alpigena* wurde die eigene Nährpflanze so schwach infiziert, daß nur eine zweifelhafte Infektion hingesetzt werden durfte, während *Alch. impexa* in diesem Experimente eine sichere Infektion lieferte.

Es steht mit dieser Anschauung eine Beobachtung in Übereinstimmung, die ich im Herbst 1907 in Davos (1560 m ü. M.) machte. Trotz eifriger Nachsuche gelang es mir nie, in diesem Bezirke eine mit Mehltau infizierte alpine Art im Freien zu finden. Dagegen sind alpine Arten besonders in den Gewächshäusern und überhaupt in Kulturen infiziert zu finden. Es steht also der Schluß nahe, daß die *Alpinae* unter gewissen Kulturbedingungen empfänglich werden und sich durch

die Oidien auf *Vulgares*-Species, die am häufigsten und fast überall zu finden sind, infizieren. Daß Pflanzen in der Kultur und durch die Pflege in Gewächshäusern für Mehltauinfektionen empfänglich werden, nimmt auch Salmon<sup>1)</sup> an, der fand, daß *Hordeum secalinum* durch das *Oidium* auf *Hordeum vulgare* unter gewöhnlichen Umständen nicht infiziert werden konnte; blieben dagegen die Pflanzen von *Hord. secalinum* 20–30 Tage in der Atmosphäre eines Gewächshauses, so erschienen nach dieser Zeit Mycelflecken. Salmon schreibt dazu: „I am inclined to believe, however, that the true explanation may lie in the fact that *H. secalinum* when in a normal healthy condition is immun against infection by conidia from *H. vulgare*, it may become susceptible when the health of the plant is gradually impaired by unfavourable conditions of growth.“

Ferner muß ich hier eine Beobachtung anführen, die ich im Sommer 1907 gemacht habe. Ich trennte Mitte Mai stark entwickelte Stöcke folgender alpinen Species in 2 Teile und pflanzte beide Teile in gesonderte Töpfe ein: *Alch. conjuncta*, *pallens* und *chirophylla*. Jede Art wurde also nun in 2 Töpfen als Geschwisterindividuen gezogen. Der eine Topf verblieb nun im Freien, während ich den anderen Topf in ein Gewächshaus stellte, das sehr warm und wenig gelüftet war, das also für die Nährpflanze ungünstige, für einen Pilzparasiten dagegen günstige Bedingungen bot. Die 3 ursprünglichen (Mutter-) Pflanzen, von denen die 6 Topfpflanzen abstammten, waren seit 1½ Jahren im Botanischen Garten gezogen worden und zeigten nie eine Mehltauinfektion. Am 11. Juni beobachtete ich eine ziemlich reichliche Mehltauinfektion auf denjenigen 3 Topfpflanzen, die im Gewächshaus standen. Eine nähere Untersuchung lehrte, daß diese Topfpflanzen neben infizierten *Vulgares*-Species: *Alch. pastoralis* und *impexa* standen. Die Geschwister dieser 3 alpinen Arten, die im Freien wuchsen, zeigten weder zu der damaligen Zeit noch später eine Spur von Infektion, obschon im Botanischen Garten fast sämtliche *Vulgares*-Species, die im Freien wuchsen, eine Mehltauinfektion aufwiesen, und die Luft wohl viele Sporen enthielt.

Augenscheinlich hatte also das Gewächshaus einen verändernden Einfluß auf diese 3 Nährpflanzen ausgeübt, so daß sie dem Mehltau gegenüber ihre Immunität verloren und empfänglich wurden.

Ich bin also geneigt, die Infektion der *Alpinae* der Kultur zuzuschreiben; dabei wäre ihre Infektion von *Vulgares* oder *Calicinae* (*Alchim. flexicaulis*, Reihe 22) aus erfolgt. Es scheint mir wahrscheinlich, daß sich vor allem die *Vulgares* an dieser Infektion beteiligt haben, weil das *Oidium* auf *Alchim. nitida* und *alpigena* wiederum *Vulgares*-Species zurück infizierte, während *Alch. fallax* (*Calicinae*) dem ersteren *Oidium* gegenüber immun blieb.

Beim Studium der Generaltabelle fällt uns auf, daß es, wie ja schon aus der großen Uebereinstimmung der einzelnen Oidien hervorgeht, keine große Zahl von Wirtsspecies gibt, die sich den einzelnen Oidien gegenüber bemerkbar verschieden verhalten. Die anderen Arten blieben annähernd sämtlichen Oidien gegenüber entweder empfänglich oder unempfindlich. So können wir die Wirtsarten in 3 Kategorien einteilen:

1) Salmon, Cultural experiments with the barley mildew, *Erysiphe graminis* DC. (*Annales Mycologici*. Vol. II. 1904. p. 70.)

1) Empfängliche Arten:

Vulgares:  
 Alch. connivens  
 „ impexa  
 „ alpestris  
 „ pastoralis  
 „ crinita  
 „ coriacea\*)  
 Calicinae:  
 Alch. fallax  
 „ flexicaulis

2) Unempfängliche Arten:

Vulgares:  
 Alch. demissa\*)  
 „ multiflora  
 Pubescentes:  
 Alch. sericata  
 Splendentes:  
 Alch. splendens\*)  
 Alpineae:  
 Alch. Hoppeana  
 „ pallens  
 „ conjuncta  
 „ chirophylla  
 Bastarde:  
 Alch. gemmia\*)

3) Arten, die sich den einzelnen Oidien gegenüber verschieden verhielten:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Vulgares:          | Alpineae:         |
| Alch. reniformis   | Alch. alpina vera |
| „ micans           | „ grossidens      |
| Pubescentes:       | „ alpigena        |
| Alch. intermedia   | „ nitida          |
| „ pubescens        | „ glacialis       |
| Splendentes:       | „ obovalis        |
| Alch. Faeroensis*) |                   |

\*) Diese Species wurde nur in wenigen Experimenten verwendet, so daß ihre Eintragung nur provisorischen Charakter hat.

Die 3. Kategorie: „Arten, die sich den einzelnen Oiden gegenüber verschieden verhielten“, beherbergt also hauptsächlich diejenigen Nährpflanzen, welche verursachen, daß nicht sämtliche Infektionskreise gleich lauten und infolgedessen nicht eine einheitliche biologische Art auf sämtlichen Alchimillenspecies vorhanden ist. Aus der verhältnismäßig kleinen Zahl dieser Arten (ca.  $\frac{1}{8}$  der Gesamtzahl) geht auch wieder hervor, was aus der Besprechung der einzelnen Infektionskreise bereits resultierte: daß die einzelnen Oidien sich nicht stark voneinander in ihrer Infektionskraft unterscheiden, also nicht als distinkte biologische Arten, sondern als kleine biologische Arten aufzufassen sind.

Ich möchte hier noch aus jeder Kategorie eine Art herausgreifen, um an ihr die Merkmale ihrer Gruppe recht deutlich zu demonstrieren.

1) Als Typus einer empfänglichen Art, eines sogenannten „Sammelwirtes“, wähle ich Alchim. impexa. Diese Art war für sämtliche Oidien empfänglich. Salmon (6) verzeichnet bei seinen Versuchen mit Bromus-Arten ein ganz ähnliches Beispiel: Bromus hordeaceus. Ich entlehne die graphische Darstellung (Fig. 1) der Empfänglichkeit einer Art dieser Salmonschen Arbeit.

2) Als Typus für die Kategorie der unempfänglichen Arten kann Alchim. conjuncta gelten. Diese Art blieb für sämtliche Oidien unempfänglich (Fig. 2).

Eine Analogie dazu findet sich ebenfalls bei Salmon (6) in der Species Bromus racemosus.

3) Für die 3. Kategorie der Arten, die sich gegen die einzelnen Oidien verschieden verhielten, ist Alchim. micans der beste Vertreter: diese Art zeigte sich für 3 Oidien empfänglich, für 5 andere dagegen unempfänglich (Fig. 3).




Fig. 1. Erklärung: Der innere kleinere Kreis bedeutet die Infektionspflanze *Alch. impexa*. Die Peripherie des äußeren Kreises beherbergt die Namen der 9 verschiedenen Oidien. → bedeutet Infektion.




Fig. 2. Erklärung: —× bedeutet Nichtinfektion.

Es sei hier noch darauf hingewiesen, daß in den beschriebenen Experimenten ein einziges Mal eine ähnliche Erscheinung auftrat, wie sie namentlich von Salmon (5 und 6) beobachtet wurde: die sogenannte „Subinfektion“. Darunter versteht Salmon eine äußerst schwache Infektion, bestehend in einigen Konidienträgern (ohne Mycel), die nach kurzer Zeit (1—2 Tage) vollständig verschwindet. In der Infektionsreihe 9 wurde *Alchim. fallax* durch das Oidium auf *Alchim. connivens* äußerst schwach infiziert (vereinzelte Mycelfäden). 4 Tage später war von dieser Infektion nichts mehr zu bemerken. Es ist aber gegenüber den „Subinfektionen“ Salmons in dieser Beobachtung ein Unterschied vorhanden. Salmon nimmt ausdrücklich an, daß bei Subinfektionen kein Mycel, sondern nur Konidienträger gebildet werden können; im vorliegenden Falle wurden aber vereinzelte Mycelfäden, ohne Konidien, beobachtet. In den anderen Versuchen kam es häufig vor, namentlich in den Experimenten mit *Alpinæ*, daß nur Konidienträger, ohne erkennbares Mycel gebildet wurden; allein in diesen Fällen reduzierte




Fig. 3. Gleiche Zeichenerklärung wie bei den Figuren 1 und 2.

sich die Infektion niemals zu Null, sondern blieb in ihrer Größe bestehen oder vermehrte sich sogar noch.

In meinen Experimenten scheint eine ähnliche Beziehung dreier Wirtspflanzen, wie sie Salmon durch den Begriff einer „bridging species“ (6) zusammenfaßt, teilweise angedeutet zu sein. Die „bridging species“ ist ein Zwischenwirt eines Oidiums, vermöge dessen dieses Oidium die Infektionskraft annimmt, die eigentlich dem Oidium, das auf dem Zwischenwirt wächst, zukommt. So vermag das Oidium auf *Bromus racemosus* *Bromus hordeaceus*, aber nicht *Bromus commutatus* zu infizieren. Dagegen infiziert das Oidium auf *Bromus hordeaceus* *Bromus commutatus*. Bringt man nun das Oidium, das auf *Bromus racemosus* wächst, auf *Bromus hordeaceus*, so kann man mit den Konidien, die aus dieser Infektion entstehen, *Bromus commutatus* infizieren. *Bromus hordeaceus* bildet also in diesem Falle eine Brücke, sie ist eine „bridging species“. Es gibt nun in meinen Experimenten verschiedene ähnliche Verhältnisse dreier Wirtspflanzen, wie sie Salmon für seine „bridging species“ voraussetzt. Zum Beispiel:

1) Die Oidien auf *Alchim. connivens* und *pubescens* infizieren *Alchim. pastoralis* und *impexa*, sie infizieren nicht *Alchim. micans*.

Die Oidien auf *Alchim. pastoralis* und *impexa* infizieren *Alchim. micans*.

Es könnten also die Species: *Alchim. pastoralis* und *impexa* als „bridging species“ dienen.

2) Das Oidium auf *Alchim. nitida* infiziert *Alchim. impexa*; es infiziert nicht *Alchim. fallax*.

Das Oidium auf *Alchim. impexa* infiziert *Alchim. fallax*.

Hier könnte eventuell *Alchim. impexa* als „Brücke“ für das Oidium auf *Alchim. nitida* dienen.

Leider vermochte ich nicht, diese Beziehungen experimentell zu prüfen; es sollte hier nur hervorgehoben werden, daß die Voraussetzungen für eine „bridging species“ in der Spezialisierung der Erysiphaceen wohl sehr oft vorhanden sind.

## D. Zusammenfassung der Resultate.

1) In den vorliegenden Experimenten ist die Infektionskraft der Ascosporen nicht verschieden von derjenigen der Konidien.

2) Das Infektionsvermögen der *Sphaerotheca Humuli* (DC) Burr. auf Alchimillenarten ist auf diese Wirtsgattung beschränkt. Wir haben also eine besondere biologische Art: *Sphaerotheca Humuli*, f. sp. *Alchimillae*, vor uns.

3) Die biologische Art: *Sphaerotheca Humuli* f. sp. *Alchimillae* kann in eine Anzahl weiterer „kleiner biologischen Arten“ zerlegt werden. Die einen dieser „kleinen biologischen Arten“ sind voneinander verschieden durch kleine, aber scharfe Unterschiede im Infektionsvermögen. Andere dagegen sind nur unscharf voneinander abgegrenzt, in dem Sinne, daß gewisse Nährpflanzen von der einen „kleinen biologischen Art“ nicht infiziert werden, während eine andere „kleine biologische Art“ dieselben Nährpflanzen äußerst schwach (in meinen Experimenten gewöhnlich mit „zweifelhaft“ bezeichnet) infiziert. Die Unterschiede in den Infektionskreisen zweier Oidien können zum Teil auch darin bestehen, daß gewisse Nährpflanzen von dem einen *Oidium* schwach, von dem anderen dagegen stark befallen werden.

4) Die Oidien, mit denen experimentiert wurde, haben das Zentrum ihrer Ausbreitung auf den Gruppen der *Vulgares* und *Calicinae*. Die anderen systematischen Gruppen, namentlich die *Alpinae*, zeigten sich für Mehлтаufinfektionen bedeutend weniger empfänglich. Innerhalb der im allgemeinen sehr empfänglichen Gruppe der *Vulgares* existieren aber auch einzelne Species mit einer spezifischen Immunität, z. B. *Alchim. multiflora*.

5) Die Infektion einzelner Species einer sonst unempfindlichen Gruppe (*Alpinae*) dürfte auf Veränderungen dieser Arten zurückzuführen sein, die hauptsächlich durch äußere (ungünstige) Verhältnisse hervorgebracht wurden (Kultur).

Gestützt auf die einzelnen Experimente und die vorstehenden Resultate, können wir versuchen, uns eine Vorstellung zu machen, wie die Spezialisierung des Mehлтаues auf Alchimillen vor sich gegangen ist. Es ist klar, daß es sich bei dieser Vorstellung nur um eine Hypothese handeln kann, die uns die bestehenden Verhältnisse am besten zu erklären vermag. Das jetzige Infektionszentrum der *Vulgares* und *Calicinae* bildet offenbar das ursprüngliche, phylogenetisch älteste Ausbreitungsgebiet des Mehлтаues. Von diesem Zentrum aus ist der Pilz durch gelegentliche Infektionen auf Alchimillenarten anderer, ursprünglich immuner Gruppen (*Alpinae*) übergegangen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die gelegentliche Infektion solcher immuner Arten auf Veränderungen dieser Wirte zurückzuführen ist, die durch äußere Einflüsse hervorgebracht wurden (siehe p. 53 und Zusammenfassung sub 5).

Dieser Ausbreitung des Pilzes von den *Vulgares* und *Calicinae* auf andere systematische Gruppen steht eine Spezialisierung innerhalb des ursprünglichen Infektionszentrums gegenüber. Die „kleinen biologischen Arten“ innerhalb der Gruppe der *Vulgares*, wie auch die „kleine biologische Art“ auf *Alchim. flexicaulis* und *fallax* (*Calicinae*) sind auf diese beginnende Spezialisierung zurückzuführen. Es ist äußerst schwierig und jedenfalls rein hypothetisch, sich die Ursachen dieser Spezialisierung klarmachen zu wollen. Hat sich der Mehltau auf dem Genus *Alchimilla* angesiedelt, bevor sich dasselbe in die be-

stehende große Zahl von Arten gespalten hat (also vor der Mutationsperiode), oder bestanden diese Alchimillenarten bereits, als der Mehltau anfang, im Genus *Alchimilla* zu parasitieren? Nimmt man das erstere an, so müßte wahrscheinlich die Mutation der ursprünglichen Species: *Alchim. vulgaris* dem Parasiten gewisse, neu entstandene Arten entzogen haben. Sehr wahrscheinlich ist die konsequente Immunität einzelner Species (*Alchim. multiflora*) auf eine solche Mutation zurückzuführen. Im 2. Falle könnte man sich als den Hauptgrund der Spezialisierung eine Abgewöhnung des Pilzes in bezug auf verschiedene Alchimillenarten infolge besonderer Standortverhältnisse vorstellen. Es wäre auch möglich, daß sich beide Faktoren: Mutation und Abgewöhnung kombiniert hätten, indem die Immunität einzelner Species auf Mutation derselben, das wechselnde Verhalten einer Art gegenüber den verschiedenen Oidien dagegen auf Ab- resp. Angewöhnung zurückzuführen wäre.

Wir haben in den „kleinen biologischen Arten“ der *Sphaerotheca Humuli* auf Alchimillenspecies die Spezialisierung eines Pilzes vor uns, der einerseits von einem bestimmten Infektionszentrum aus auf andere Nährpflanzen überging und dort zu neuen „kleinen biologischen Arten“ wurde, und der andererseits in seinem ursprünglichen Infektionsgebiet selber im Begriffe ist, sich in eine Anzahl biologischer Arten zu spalten.

#### Literatur.

- 1) Neger, F. W., Beiträge zur Biologie der Erysipheen. (Flora. Bd. XC. 1902. p. 221—272.)
- 2) Marchal, E., De la spécialisation du parasitisme chez l'Erysiphe graminis. (Comptes Rendus. T. CXXXV. 1902. Juli 21. p. 210.)
- 3) —, De la spécialisation du parasitisme chez l'Erysiphe graminis. (Comptes Rendus. T. CXXXVI. 1903.)
- 4) Salmon, E. S., A monograph of the Erysiphaceae. (Memoirs of Torr. Bot. Club. Vol. IX. 1900.)
- 5) —, On specialization of parasitism in the Erysiphaceae. (Beihefte zum Botan. Centralbl. Bd. XIV. 1903. p. 261.)
- 6) —, On Erysiphe graminis and its adaptive parasitism within the genus Bromus. (Annales Mycologici. Vol. II. 1904. No. 3 u. 4.)
- 7) —, On specialization of parasitism in the Erysiphaceae. (New Phytologist. Vol. III. 1904. p. 109.)
- 8) —, Infection powers of Ascospores in Erysiphaceae. (Journ. of Botan. Vol. XLI. 1903. p. 159.)
- 9) —, Cultural experiments with „biologic forms“ of the Erysiphaceae. (Phil. Trans. of the Royal Soc. of London. Series B. Vol. CXCVII. 1904. p. 107—122.)
- 10) —, Further cultural experiments with „biologic forms“ of the Erysiphaceae. (Annals of Botany. Vol. XIX. 1905. No. 73.)
- 11) —, On specialization of parasitism in the Erysiphaceae III. (Annales Mycologici. Vol. III. 1905. p. 172.)
- 12) Reed, G. M., Infection experiments with Erysiphe graminis. (Transactions of the Wisconsin Academy of sciences, Arts and Letters. Vol. XV. Part I. Decemb. 1905. p. 135.)
- 13) —, Infection experiments with the mildew on Cucurbits, Erysiphe Cichoracearum DC. (Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters. Vol. XV. Part. II. May 1907.)
- 14) Magnus, P., Der Mehltau auf Syringa vulgaris in Nordamerika. (Ber. d. D. Bot. Gesellschaft. Bd. XVI. 1898.)
- 15) Buser, R., Alchimilla. (Catalogue de la flore valaisanne par Henri Jaccard.)
- 16) Fischer, Ed., Die Uredineen der Schweiz. (Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz. Bd. II. 1904. Heft 2.)
- 17) —, Der Speciesbegriff bei den parasitischen Pilzen. (Verhandl. der Schweiz. Naturf. Gesellsch. an der Jahresversammlung in Luzern 1905.)



Fig 3.




Fig 6.





Fig 9.







---

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena

---

